

Dirección Regional Salud Tumbes

Dr. Harold Leoncio
Burgos Herrera
Director General

Oficina de Epidemiología

Lic. Silvia Conde Sosa
Directora

Dr. César Augusto
Noblecilla Rivas
Méd. Epidemiólogo

Dr. Fernando Antonio
Quintana Infante
Méd. Epidemiólogo

Bach. Ronald Edward
Hernández Vargas
Responsable
Informática VEA

Téc. Carlos Eladio
Olivares Barrientos
Coord. Regional VEA

Lic. Gabriela Oviedo
Mesaldi
Miembro Equipo
Técnico

Teléfono.: 072 522427
Telefax: 072 523789

Email:

epitumbes@dge.gob.pe

Visite nuestra Web :

www.diresatumbes.gob.pe



Del 19 al 25 de Diciembre del 2010

Presentación

La oficina de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la semana epidemiológica 51 el cual contiene información actualizada del comportamiento de los principales daños sujetos a vigilancia, que han sido notificados en la presente semana por los establecimientos de la red de vigilancia epidemiológica de la región.

Los excesos navideños pueden poner en "grave peligro" la salud de las personas mayores

28 de diciembre de 2010

Recuerdan que la mayor parte de este grupo de edad tiene alguna enfermedad cuyo tratamiento guarda relación con la alimentación

Los excesos durante las fiestas navideñas pueden "poner en grave peligro" la salud de las personas de más de 65 años, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de este grupo de edad tiene alguna enfermedad cuyo tratamiento tiene relación con la alimentación, tal como advierte la Sociedad Española de Geriátrica y Gerontología (SEGG).

Los datos de esta entidad indican que un 52% de ellos tiene hipertensión, un 18% diabetes, un 30% hipercolesterolemia, un 12% estreñimiento crónico y hemorroides y un 15% padece osteoporosis, enfermedades ante las que "las celebraciones pueden traer consigo efectos negativos para la salud si no tenemos cuidado con lo que comemos". Además, un elevado porcentaje de mayores se enfrenta también a otro tipo de problemas que influyen en su alimentación y nutrición, como la falta de piezas dentarias o las prótesis dentales mal ajustadas, que trae consigo problemas de masticación.

La atrofia en las papilas gustativas, que alteran el sentido del gusto, puede incrementarse por el habitual consumo de medicamentos que se da en los ancianos. Otros riesgos pueden estar relacionados con retrasos en el vaciado del estómago, que produce digestiones más lentas y gases, o con el intestino delgado que, con el paso del tiempo, disminuye la superficie de absorción y, por tanto, se aprovechan peor las sustancias nutritivas. Del mismo modo, en el intestino grueso puede haber un tránsito intestinal más lento, lo que propicia el riesgo de padecer estreñimiento.

Desde la SEGG recomiendan a este grupo de edad comer entre cuatro y seis veces al día, así como aumentar el consumo de cereales, preferiblemente integrales. También aconsejan comer tres piezas de fruta, dos raciones de verdura, tres raciones de lácteos poco grasos y dos raciones de alimento proteicos (alternar la carne, pescado y huevos).

Además, en relación con los menús navideños, insisten en moderar el consumo de sal y azúcar en los platos y postres, que el consumo de alcohol no sobrepase uno o dos vasos de vino, así como incluir propuestas gastronómicas novedosas y adecuadas a estas fiestas, pero tras adaptar las texturas de los platos a las dificultades más habituales para tragar

Fuente <http://www.consumer.es/web/es/salud/2010/12/28/198029.php>

Contenido:

Malaria
Dengue
EDAs
IRAs

Neumonías May. 5 años
Muerte Materna
Infecciones Intrahospitalarias
Otros daños sujetos a Vigilancia Epid.





Enfermedades Sujetas a Vigilancia




Malaria

En la SE 51 se han notificado 06 casos de malaria, que por fecha de inicio de síntomas pertenecen a la SE 50 (06 casos del presente año. De los casos notificados todos corresponden a malaria Vivax.


De estos casos notificados, los 06 corresponden al distrito Tumbes. De los 13 distritos de la Región Tumbes, durante la presente semana 12 de ellos no reportan casos.

Hasta la SE 51 del presente año a nivel regional se ha notificado un total de 1761 casos de malaria (1748 vivax y 13 falciparum autóctonos, cifra superior a la del año pasado (1439 casos), para este mismo periodo, evidenciando un relativo aumento de casos de 1,22 veces de casos notificados.



La tasa de incidencia acumulada de malaria a nivel regional a la SE51 es de 8,23 casos por 1000 habitantes, siendo los distritos de Papayal (16,86), Corrales (14,62) y Tumbes (10,92) los que presentan mayor incidencia de casos por cada 1000 hab. En el presente año 04 de los trece distritos no han notificado casos de malaria.


Mapa de Estratificación Riesgo de Malaria año 2010 - S.E. 51



La edad promedio de los casos de malaria es de 33 años con una desviación estándar de +/-17 años. El 70% de los casos corresponden al grupo etáreo comprendido entre los 20 a 64 años y el grupo de 10 a 19 años aporta el 20% de los casos. El 61% de los casos corresponden al sexo masculino.

Durante el presente año el comportamiento de la malaria muestra un periodo epidémico alcanzando un máximo pico en la SE 20 a partir de la cual muestra un descenso manteniéndose entre la zona epidémica y la zona de alerta. La última semana se encuentran en Zona de Seguridad, la misma que probablemente puede variar con el reporte de las semanas epidemiológicas en curso.

Canal endémico malaria Región Tumbes 2010 (SE 51)



Denque

En la Región Tumbes en la SE 51 se ha notificado 01 caso probable de dengue procedente del distrito de Papayal.


En el presente año se notificaron 1506 casos probables de dengue de los cuales 710 casos han sido confirmados por laboratorio, habiéndose notificado 04 casos de dengue hemorrágico de los cuales 03 han fallecido pertenecientes al distrito de Aguas Verdes, y los casos confirmados son procedentes del distrito de Tumbes (312), Aguas Verdes (82), Zarumilla (75), Papayal (69), San Juan de la Virgen (48), La Cruz (46), Pampas de Hospital (30), San Jacinto (16), Canoas de Punta Sal (13), Zorritos (07), Matapalo (08) y Corrales (04).

Hasta la SE 51 del presente año comparando las cifras de los casos notificados (1506) con la del año pasado (814), existe un aumento de 1,85 veces más de casos notificados para este mismo periodo.

La tasa de incidencia hasta la SE 51 del presente año es de 6,80 casos por 1000 hab., incidencia acumulada a nivel regional superior a la del año pasado que fue de 4,00

Durante todo el presente año el comportamiento del Dengue ha tenido un periodo epidémico habiendo alcanzado su máximo pico en la SE 21, presentándose un incremento llegando a la Zona de Epidemia en las SE 44 y 45.

Canal endémico de Dengue Región Tumbes 2010 (SE 51)






La presencia del *Aedes aegypti* se encuentra disperso en toda la Región Tumbes.

La situación de riesgo para la región se incrementa por lo general a inicios de cada año.


El comportamiento semanal de las IRAs al inicio del año es irregular, con una tendencia a incrementarse en los meses de descenso de la temperatura.

El análisis del canal endémico muestra que a la SE 51 del presente año las IRAs se encuentran en niveles de Seguridad, Alerta y Éxito. Es necesario continuar desarrollando acciones de prevención y control de las IRAs a fin de controlar la incidencia de casos.

Comportamiento del Dengue en la Región Tumbes 2010



Comportamiento de las IRAs en menores de 5 años SE 51 - 2010 Canal endémico Región Tumbes



NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

A la SE 51 se han notificado 119 casos de neumonía en mayores de 5 años.

La tasa de incidencia regional, en el 2010 a la SE 51, de las neumonías en mayores de cinco años es de 6,18 casos de neumonías por cada 10000 mayores de cinco años.

En el año 2009 la tasa fue 6,94 por 10000 hab. y las mayores tasas de neumonía correspondieron al grupo de 5 a 9 años con 92 casos por cada 10000 hab. La tasa en el grupo mayores de 60 años de 24 por cada 10000 hab. La menor tasa de neumonía corresponde al grupo de 10 a 19 años con un valor de 1 por cada 10000 hab.


INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs)

En la SE 51 del presente año se han notificado a nivel regional 356 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, de los cuales 13 casos corresponden a SOB, no se presento casos de neumonía grave y no se notificó casos de neumonía no grave; hasta la fecha se han notificado 58 casos de Neumonías Graves en menores de 5 años cifra relativamente superior a la del año pasado (32 casos).

Durante el presente año se viene notificando 24743 casos, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior una disminución de 17,64% en la incidencia de casos de IRAs notificados, habiéndose reportado en el 2009 (30043 casos).

La tasa de incidencia regional a la SE 51 por IRAs en menores de 5 años es de 1153,4 por cada 1000 menores de cinco años. Los distritos de Papayal, San Juan de la Virgen y Aguas Verdes han reportado las mayores tasas, mientras que Tumbes, Matapalo y Casitas reportan las menores tasas.


Incidencia distritos de IRAs en menores de 5 años Región Tumbes 2010 (SE 51)



Influenza A H1N1

En lo que va del año 2010 se han notificado 04 casos de Influenza H1N1, pertenecientes al distrito de Tumbes (03) y al distrito de Zarumilla (01).

Casos Confirmados de "nueva" Influenza A H1N1





PERÚ

Ministerio de Salud




ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)

En lo que corresponde a la SE 51 del presente año se han notificado a nivel regional 120 casos de EDAs, de las cuales 118 (98%) corresponden a EDAs acuosas, se han notificado 02 casos de EDA disintérica y no hay casos sospechosos de cólera.

La tasa de incidencia regional correspondiente a la SE 51 es de 34,98 casos de EDAs por cada mil habitantes. Los distritos de Pampas de Hospital, Matapalo y Canoas de Punta Sal presentan las más altas tasas. Los distritos de Corrales, Tumbes y Casitas han notificado las menores tasas de incidencia de EDAs.

Tasas de incidencia distrital de EDAs población general
Región Tumbes 2010 (SE 51)




En los menores de 5 años se ha notificado a nivel regional 4415 casos de EDAs (62% del total de EDAs notificadas). La tasa de incidencia en menores de cinco años es de 205,81 casos por cada 1000 menores de cinco años.

El comportamiento semanal de las EDAs en la Región tiene una tendencia irregular, presentándose al inicio del año en niveles de Alerta, Seguridad y Éxito, presentándose un incremento llegando a la Zona de Epidemia en la SE 42.


En el presente año comparativamente con la SE 51 del año anterior se reporta una disminución del 2,84% en la incidencia de casos (7707 vs. 7488 casos en los años 2009 y 2010 respectivamente).

Comportamiento de las EDAs en población general SE 51 – 2010
Canal endémico Región Tumbes



MORTALIDAD MATERNA

En el presente año, hasta la SE 51 se han notificado 03 casos de mortalidad materna pertenecientes a los distritos de Tumbes (02) y Corrales (01).



ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS

Hasta la SE 51 del presente año se han notificado 09 casos de accidentes Ofidismo (mordedura de serpiente) procedentes de los distritos de Pampas de Hospital (02 casos), Tumbes (03 casos), Zorritos (02 casos), Corrales (01 caso) Y distrito de Zarumilla (01 caso); en los distritos de Tumbes se ha presentado 02 caso de Loxocelismo (mordedura de araña) en la localidad de San Isidro - distrito de Corrales y distrito de Zarumilla.

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

En el mes de Noviembre del año 2010 el Hospital JAMO - Tumbes se notificó 03 casos de Infecciones Intrahospitalarias. Se vigilaron 228 pacientes.

En el servicio de neonatología de un total de 42 días-exposición a catéter venoso periférico que correspondió a la vigilancia de 14 neonatos, no se reportaron casos de IIH.

En el servicio de obstetricia de un total de 84 partos vaginales vigilados no se registró caso de endometritis. De un total de 101 partos vía cesárea se reportó 03 casos de infección de herida operatoria y no se presentó caso de endometritis.

En el servicio de medicina de 26 días exposición a catéter urinario permanente vigilado (04 pacientes), no se reportaron casos de infección del tracto urinario asociadas a este dispositivo.

En el servicio de cirugía no se presentaron casos de infección del tracto urinario asociados a catéter (21 días de exposición). En este servicio no se presentaron casos de infección de herida operatoria postcolecistectomía (15 pacientes vigilados) ni casos de posthernioplastia inguinal (06 pacientes vigilados).

COBERTURA DE NOTIFICACIÓN

Durante el presente año a la SE 51 se ha logrado una notificación oportuna del 100% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Al inicio del presente año no se han notificado casos probables de Sarampión/Rubéola.