



DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES

Boletín Epidemiológico Regional 04-2018

Del 21 al 27 de enero de 2018

Lic. Wilmer John Davis Carrillo
Director General

Presentación

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 04. La información del presente Boletín Epidemiológico, procede de la notificación de 45 establecimientos de salud de la Red Regional de Epidemiología. La Red Regional está conformada por establecimientos de la Dirección Regional de Salud Tumbes, EsSalud y otros del sector salud de la región Tumbes. Esta información es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación. Esta información es suministrada semanalmente por la Red Regional de Epidemiología de Tumbes, cuya fuente es el registro semanal de enfermedades y eventos sujetos a notificación inmediata o semanal. La Semana Epidemiológica inicia el día domingo de cada semana y concluye el día sábado siguiente.

Editorial

VARICELA

¿Qué es la varicela?

Es una enfermedad causada por un virus muy contagioso que afecta generalmente a los niños, pero puede afectar a adolescentes y adultos.

¿Cómo te puedes contagiar?

La varicela se contagia principalmente desde la aparición de las ampollas hasta que se forman las costras en la piel de la cabeza y cuerpo. Te contagias al tocar el líquido presente en las ampollas o cuando una persona con varicela tose o estornuda.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas son: fiebre y lesiones en la piel tipo ampollas que producen mucha picazón y que luego se hacen costra.

¿Cuánto dura la enfermedad?

La enfermedad dura de 10 a 21 días y usualmente desaparece sola. Para el tratamiento debes acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. No te automediques.

¿Qué cuidados debo tener?

Los niños con varicela no deben ir a la escuela o a otros lugares donde hayan más niños, así evitaremos contagios. El niño con varicela debe tener las manos siempre lavadas con agua y jabón y las uñas cortas para evitar infecciones. Debe bañarse todos los días con agua limpia del hogar, esto ayudará a refrescarse y evitar la infección por otros microbios en las zonas afectadas. Si hay mucha picazón aplicar maicena o avena humedecida sobre el cuerpo. Controlar la fiebre con baños de agua fría. Ante cualquier duda, consulte a un profesional en el establecimiento de salud más cercano o comuníquese a la línea de consulta Infosalud 080010828 las 24 horas del día.

¿La varicela puede ser grave?

La mayoría de los niños que contraen varicela se recuperan completamente. Pero la varicela puede ser grave, incluso mortal, especialmente para los bebés, las mujeres embarazadas, los adolescentes, los adultos y las personas con el sistema inmunitario debilitado. Asegúrese de que todos en su familia estén al día con las vacunas contra la varicela.

El Ministerio de Salud ha anunciado que desde el mes de abril del presente año se comenzará a vacunar contra la varicela a los niños a partir de un año de edad, así como a personas en estado de vulnerabilidad como el personal sanitario que atiende estos casos.

Fuente: <https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2017/varicela/index.asp?op=3>
<https://peru21.pe/peru/abril-empezara-vacunacion-varicela-pais-393762>
<https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/varicela/index.html>

Dirección Ejecutiva de Epidemiología Staff

Dr. Rommell GONZÁLEZ
SEMINARIO
Director Ejecutivo

Dr. Cesar NOBLECILLA RIVAS
Médico Epidemiólogo

Dr. Fernando A.
QUINTANA YNFAnte
Médico Epidemiólogo

Dra. María Edith
SOLÍS CASTRO
Médica Cirujana

Lic. Nélica JULCA MENDOZA
Equipo Técnico

Tec. Carlos Eladio
OLIVARES BARRIENTOS
Coord. Reg. de Vigilancia
Epidemiológica

Bach. Ronald Edward
HERNÁNDEZ VARGAS
Responsable Regional de
Notificación

Bach. Milagros LOJAS
RODRÍGUEZ
Equipo Técnico

Comité Editor

Dra. María Edith
SOLÍS CASTRO
Redacción y Edición
Bach. Ronald Edward
HERNÁNDEZ VARGAS
Diseño y Proceso de Información

Contenido

- ✓ Neumonías Mayores de 5 años
- ✓ Muerte Materna y Perinatal
- ✓ Infecciones Intrahospitalarias
- ✓ Otros daños sujetos a Vigilancia Epidemiológica
- ✓ Malaria, Dengue
- ✓ Chikungunya, Zika
- ✓ EDAS
- ✓ IRAS




email: epitumbes@dge.gob.pe
www.diresatumbes.gob.pe



Av. Fernando Belaunde Terry Mz. X Lt. 1-10
Urb. José Lishner Tudela
Telefax: 072 523789

Mapa de Riesgo según 06 últimas semanas epidemiológicas (47-52 /2017) de Dengue - Región Tumbes



Según la clasificación clínica son: 67 (91.8%) casos de dengue sin signos de alarma, 06 (8.22%) casos de dengue con signos de alarma.

El 84% (61) de los casos de dengue fueron notificados por los distritos Tumbes, Zarumilla y Zorritos.

Dengue -Distribución según Etapa de Vida Región Tumbes 2018 (SE 04)

PORCENTAJE %	GRUPO DE EDAD				
	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
REGION TUMBES	13.70	20.55	28.77	31.51	5.48

Los múltiples factores que presenta en conjunto la Región Tumbes (períodos lluviosos, escasos servicios de saneamiento básico, acúmulo de inservibles, índices aéreos elevados), aunado a la pobre respuesta en salud del autocuidado de la población (mantener en adecuado estado los depósitos de agua de su casa, uso de la "motita" de piriproxifen, uso de celosías, entre otros), débil involucramiento de los actores sociales para la solución de la problemática sanitaria y casos confirmados de Dengue tanto al sur (Piura) como al norte (Ecuador) de la Región, nos sitúa en RIESGO permanente para la transmisión de Dengue. Se continúan intensificado las acciones de control vectorial en todos los distritos de la Región, pero solo el trabajo sostenido y multisectorial logrará reducir y mantener los casos controlados.

Casos de Dengue Notificados por Otras DIRESAS y Región Tumbes 2018 (SE 04)

Casos de Dengue	Confirmados	Probables	TOTAL
Otras DIRESAS	25	45	70
Tumbes	0	73	73
REGION TUMBES	25	118	143

Tasa de incidencia distrital de Dengue a la S.E. 04 -2018- Región Tumbes


DISTRITO	T.I	CASOS
Matapalo	0.00	0
A Verdes	0.00	0
San Jacinto	0.00	0
Canoas	0.00	0
P de Hosp.	0.14	1
Corrales	0.16	4
Papayal	0.19	1
San Juan	0.24	1
REGIONAL	0.30	73
Tumbes	0.39	45
Zarumilla	0.39	9
La Cruz	0.43	4
Casitas	0.46	1
Zorritos	0.56	7

Casos de Dengue - Región Tumbes 2018 (SE 04)

DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	0	67	67
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	0	6	6
DENGUE GRAVE	0	0	0
FALLECIDO	0	0	0
REGION TUMBES	0	73	73


Según etapa de vida de los pacientes reportados como sospechosos de Dengue, los más afectados resultan ser los adultos y jóvenes, y según sexo las mujeres (60%).

Dengue -Distribución según Sexo Región Tumbes 2018 (SE 04)



Hasta la SE 042018 adicionalmente otras DIRESAS han notificado 70 casos de dengue. Las DIRESAS que notificaron casos fueron DISA Callao, Lima. La Libertad, Lambayeque y Piura.

El *Aedes aegypti* se encuentra disperso en los 13 distritos (100%) de la Región Tumbes, por lo que la situación de riesgo se mantiene a lo largo del año, tanto para Dengue, como para las otras arbovirosis (Chikungunya y Zika) transmitida por el mismo zancudo.



CHIKUNGUNYA

En la SE 04-2018 se han reportado 02 casos de Chikungunya. El 50% fue considerado probable. Se confirmó 01 caso (50%). Los casos provienen del distrito Tumbes.

En lo que va del año 2018 a nivel nacional se registra disminución en el número de casos notificados. El 45% de los casos se reportaron en 2 departamentos: San Martín y Piura. Fuente: CDC Sala Situacional SE 03-2018.

Del total de reportados en la Región Tumbes los niños y adultos son los más afectados. La tasa de incidencia regional es de 0.01 casos por 1000 hab.

Casos de Fiebre por virus Chikungunya - Región Tumbes 2018 (SE 04)


	Frecuencia	%
Confirmado	1	50.00%
Probable	1	50.00%
Total general	2	100.00%

Casos de Fiebre por virus Chikungunya por Grupos de Edad Región Tumbes 2018 (SE 04)


	Frecuencia	%
Adulto	1	50.00%
Niño	1	50.00%
Total general	2	1

Se interviene la Región con la aplicación de Piriproxifen en "motitas" (control larvario), las que se cuelgan en los depósitos de agua mediante un nylon, los cuales debe de conservarse por 03 meses, se realiza búsqueda en campo (casa por casa) de personas que puedan tener Dengue, Chikungunya o Zika, para la intervención oportuna con control larvario o fumigación (última barrera de acción).


Mapa de Riesgo de Fiebre por virus Chikungunya
Región Tumbes 2018 (SE 04)



Mapa de Riesgo según 06
últimas semanas
epidemiológicas 2017 (47-52)
de Chikungunya - Región
Tumbes



Fiebre por virus Chikungunya
Región Tumbes 2015-2017




Casos de Fiebre por virus Chikungunya - Región Tumbes 2018 -SE 04

DISTRITO	T.I	CASOS
A Verdes	0.00	0
Matapalo	0.00	0
Casitas	0.00	0
Corrales	0.00	0
Papayal	0.00	0
San Juan	0.00	0
Tumbes	0.02	2
P de Hosp.	0.00	0
REGIONAL	0.01	2
San Jacinto	0.00	0
Zorritos	0.00	0
Zarumilla	0.00	0
La Cruz	0.00	0
Canoas	0.00	0

ZIKA

Mapa de Riesgo de Fiebre por virus Zika
Región Tumbes SE 04-2018



Mapa de Riesgo según 06 últimas
semanas epidemiológicas 2017
(47-52) de Zika - Región Tumbes



Casos de Zika Región Tumbes 2018 (SE 04)

	Sospechoso	Total
ZIKA EN GESTANTES	10	10
TUMBES	9	9
ZORRITOS	1	1
Total	10	10

Número de casos y tasa de incidencia por zika según
departamentos Perú 2017-2018*


Departamentos	2017 (hasta la SE 52)			Año 2018 (Hasta la SE 3)			Casos en la SE 3 2018
	Total 2017	%	TIA 100 000 Hab.	Total 2018*	%	TIA 100 000 Hab.	
ICA	4325	65.1	544.08	3	2.1	0.37	2
LORETO	1268	19.1	120.84	23	16.0	2.17	7
TUMBES	365	5.5	151.71	8	5.6	3.29	0
AMAZONAS	145	2.2	34.21	75	52.1	17.65	24
LA LIBERTAD	193	2.9	10.25	0	0.0	0.00	0
PIURA	140	2.1	7.53	5	3.5	0.27	2
LIMA	110	1.7	1.10	0	0.0	0.00	0
UCAYALI	42	0.6	8.38	21	14.6	4.14	1
SAN MARTIN	29	0.4	3.40	5	3.5	0.58	0
CAJAMARCA	16	0.2	1.04	1	0.7	0.07	0
PASCO	1	0.0	0.33	1	0.7	0.32	0
LAMBAYEQUE	2	0.0	0.23	0	0.0	0.00	0

Fuente: CDC - MINSA Perú. www.dge.gob.pe. Sala Situacional SE 03-2018

Hasta la SE 04-2018 se reportan 10 casos sospechosos de Zika. No se han confirmado casos. Los casos sospechosos son gestantes. Los casos proceden de los distritos de Tumbes (09) y Zorritos (1), además, se identifican casos sospechosos de otros distritos pertenecientes a la Región Piura: Máncora (1). La demora en la obtención de resultados dificulta y reduce el impacto de las intervenciones. Durante el año 2017 se reportaron 16 gestantes afectadas por el virus Zika, de las cuales todas tuvieron sus partos. Se ha detectado 01 caso de microcefalia asociado a Zika hasta la fecha. Se recomienda a las mujeres evitar salir embarazadas, hasta que la epidemia de Zika se controle, y a las mujeres embarazadas proteger sus casas con celosías en puertas y ventanas para evitar que se contagien por el virus Zika, esta última recomendación es válida para toda la población tumbesina. Se reportó en el 2017 el primer caso de Síndrome de Guillain Barré asociado a un caso Zika confirmado.

En lo que va del año 2018 no se han reportado casos de Síndrome de Guillain Barré asociado a Zika.

Casos por virus Zika
Región Tumbes 2016- 2018 (SE 04)



Casos de Zika Región Tumbes 2018 (SE 04)

	Frecuencia	%
Sospechoso	10	100.00%
Total	10	100.00%

Casos de Zika por Grupos de Edad
Región Tumbes 2018 (SE 04)

	Frecuencia	%
Adolescente	2	20.00%
Adulto	2	20.00%
Joven	6	60.00%
Total	10	100.00%

Casos de Zika Región Tumbes 2018 (SE 04)



	S	Total
ZIKA EN GESTANTES	11	11
MANCORA	1	1
TUMBES	9	9
ZORRITOS	1	1
Total	11	11

Los primeros casos de zika fueron captados en los EESS como dengue y fueron procesados para zika por diagnóstico diferencial de dengue. Es necesario continuar fortaleciendo la vigilancia de gestantes con zika, así como también la toma de muestras oportunas a los recién nacidos de madres confirmadas a zika en la gestación y de casos con síndrome congénito.

LEPTOSPIROSIS Y RICKETTSIOSIS

Hasta la SE 04-2018 se reportan 23 casos de Leptospirosis de los cuales 22 son probables (95.7%) y se ha confirmado 01 caso (4.3%) (Tumbes). En lo que va del año 2018 no se han notificado casos de Rickettsiosis.

La tasa de incidencia regional es de 0.09 casos por 1000 hab. Las condiciones en la Región como la humedad, las deficiencias higiénicas que ocasionan infección por roedores y poblaciones no controladas de perros, afloramiento de desagües y otras favorecen la aparición y persistencia de los casos.



Casos, tasas de incidencia Leptospirosis. Perú 2018* (Semana Epidemiológica N° 03) Fuente: CDC Sala Situacional SE 03-2018

Departamentos	N° de Casos	Incidencia x 1000	%	Fallecidos
MADRE DE DIOS	105	0.73	43.93	1
LORETO	46	0.04	19.25	0
UCAYALI	44	0.09	18.41	1
AYACUCHO	17	0.02	7.11	0
TUMBES	9	0.04	3.77	0
SAN MARTIN	7	0.01	2.93	0
ICA	3	0.00	1.26	0
LAMBAYEQUE	2	0.00	0.84	0
LA LIBERTAD	2	0.00	0.84	0
PIURA	1	0.00	0.42	0
PASCO	1	0.00	0.42	0
JUNIN	1	0.00	0.42	0
LIMA	1	0.00	0.42	0
AMAZONAS	0	0.00	0.00	0

Tasa de incidencia distrital de Leptospirosis - Región Tumbes 2018 (SE 04)

DISTRITO	T.I	CASOS
Aguas Verdes	0.00	0
Casitas	0.00	0
San Juan de la Virgen	0.00	0
San Jacinto	0.00	0
Matapalo	0.00	0
La Cruz	0.00	0
Pampas de Hospital	0.00	0
Papayal	0.00	0
Corrales	0.00	0
Zarumilla	0.00	0
Canoas Punta Sal	0.00	0
Zorritos	0.08	1
REGIONAL	0.09	23
Tumbes	0.19	22

Casos de Leptospirosis Región Tumbes 2018 (SE 04)


	Frecuencia	%
Confirmados	1	4.35%
Probables	22	95.65%
Total general	23	100.00%

	C	P	Total
TUMBES	1	21	22
ZORRITOS		1	1
Total	1	22	23

Casos de Leptospirosis por Grupos de Edad Región Tumbes 2018 (SE 04)

	Frecuencia	%
Adolescente	5	21.74%
Adulto	6	26.09%
Adulto Mayor	2	8.70%
Joven	9	39.13%
Niño	1	4.35%
Total general	23	100.00%

Mapa de Riesgo según 06 últimas semanas epidemiológicas 2017 (47-52) de Leptospirosis - Región Tumbes




INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs), NEUMONIAS Y SOB

En la SE 04 del presente año se han notificado a nivel regional 255 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, 08 casos de SOB, se reportan 01 caso de neumonía y 00 casos de neumonía grave.

Durante el presente año se viene notificando 1090 casos de IRAs, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior (1220 casos) una disminución de 10.66% de casos notificados.


La tasa de incidencia regional en la SE 04 por IRAs en menores de 05 años es de 54.87 casos por cada 1000 menores de cinco años. El distrito de Papayal ha reportado las mayores tasas de incidencia de IRAs en < 5 años. Las condiciones ambientales favorecen la presencia de IRAs por lo que la población debe tomar las medidas de prevención y acudir a los establecimientos en caso de presentar síntomas respiratorios sobre todo en niños.

Incidencia acumulada distrital de IRAs en menores de 5 años Región Tumbes 2018 (SE 04)



El análisis del canal endémico de IRAs en <5 años, muestra que estamos en la zona de SEGURIDAD en la SE 04 del presente año.

Comportamiento de IRAs SE 04 – 2018 Canal Endémico Región Tumbes



En la SE 04 no se reportan fallecidos por IRAs; se han hospitalizado en la SE 04-2018 10 casos en < 5 años. La tasa de letalidad es de 0.00 en <5 años.


La variación irregular de la temperatura aumentaría el riesgo de la presencia de Neumonías y Neumonías Graves por lo que es preciso mantener la vigilancia y la adecuada atención de los pacientes y evitar sus complicaciones.

NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la SE 04 no se ha notificado casos de neumonía grave en mayores de 5 años; en la SE 04 se han notificado 28 casos de neumonías en > 05 años, alcanzando una tasa de incidencia de 1.25 casos por 10,000 hab.

NEUMONIAS > 5 AÑOS	CASOS	POBLACIÓN > 5 AÑOS	INCIDENCIA x 10000 hab.
Suma de NEU_5_9A	4	20656	1.94
Suma de NEU_10_19	1	40984	0.24
Suma de NEU_20_59	7	142322	0.49
Suma de NEU_60A	16	19535	8.19
TOTAL NEUMONIAS > 5 AÑOS	28	223497	1.25

Mapa de Riesgo según 06 últimas semanas epidemiológicas 2017 (47-52) de IRAs en menores de 5 años - Región Tumbes




INFLUENZA

En la SE 04 se han confirmado 02 casos de influenza A H3N2 (niños) procedentes de Zarumilla y en la SE 03 se confirmó 01 caso de Influenza A H1N1 en un adolescente procedente de Zarumilla. Existe circulación de virus Influenza de cepas diferentes. Se ha reportado un brote de influenza AH1N1 en el Ecuador. Se está reforzando la vigilancia en la zona de frontera.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)


Tasas de incidencia acumulada distrital de EDAs Población General – Región Tumbes 2018 (SE 04)



En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional 39 casos de EDAS en la SE 04. Las EDAS en menores de 05 años constituyen el 42.95% del total de EDAS notificadas. La tasa de incidencia regional en menores de cinco años es de 6.44 casos por cada 1000 menores de cinco años. En el presente año comparativamente con la SE 04 del año anterior, se reporta una disminución del 103% en la incidencia de casos de EDAS en < 5 años (261 y 128 casos en los años 2017 y 2018 respectivamente). Se han hospitalizado en la SE 04: 02 casos de EDAS en < 5 años. No se reportan fallecidos por EDAS.

El análisis del canal endémico EDAS en Población General, muestra que en la SE 04 del presente año, estamos en zona de ÉXITO, sin embargo existen localidades que han reportado un incremento en el número de casos, por lo que tanto las autoridades sanitarias como los gobiernos locales deben en conjunto tomar las acciones correctivas para controlar y disminuir la incidencia de casos.

Tasas de incidencia acumulada distrital de EDAS en menores de 5 años Región Tumbes 2018 (SE 04)



Mapa de Riesgo según 06 últimas semanas epidemiológicas 2017 (47-52) de EDAS en menores de 5 años - Región Tumbes


RIESGOS	0	0
Sin Riesgo	0.1	8.0
Bajo Riesgo	8.1	16.0
Mediano Riesgo	16.1	24.0
Alto Riesgo		




En lo que corresponde a la SE 04 del presente año se han notificado a nivel regional 86 casos de EDAS en Población General (con una DISMINUCIÓN de 81.9% en relación a la misma semana del año anterior, 542 vs 298 casos en relación a los años 2017 y 2018 respectivamente). El 100% corresponden a EDAs acuosas, no se han notificado casos de EDA disintérica en < de 5 años.

La tasa de incidencia regional correspondiente a la SE 04 es de 1.22 casos de EDAS en Población General por cada mil habitantes. Los distritos de Casitas, San Juan de la Virgen, San Jacinto, Papayal y Zorritos presentan las más altas tasas, por lo que se deben fortalecer las actividades de prevención como adecuado lavado de manos, uso de agua potable, eliminación adecuada de excretas, mejora en el saneamiento básico, entre otras. Ante casos de EDAS sobre todo en niños los padres o familiares deberán hidratarlos y acudir al establecimiento de salud más cercano.

Mapa de Riesgo según 06 últimas semanas epidemiológicas 2017 (47-52) de EDAS en Población General - Región Tumbes



Comportamiento de las EDAs en Población General SE 04 – 2018 Canal Endémico Región Tumbes



TENIASIS Y EPILEPSIAS POR CISTICERCOSIS

En la SE 04 del presente año NO se han reportado casos sospechosos de Teniasis; no se registran casos de Epilepsia asociada a Cisticercosis.



MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL

En el año 2017 en la Región Tumbes, se notificó **01 muerte materna directa**: Mujer de 40 años procedente de Corrales (puérpera). La DIRESA Lima notificó una muerte materna tardía adicional.

En lo que va del año 2018 no se han notificado muertes maternas.

Se reportaron en el año 2017 **32 muertes fetales y 26 muertes neonatales**. En lo que va del año 2018 no se han reportado muertes fetales ni neonatales.

TUBERCULOSIS

Hasta la SE 04 del presente año se ha notificado 08 casos de TBC (07 en adultos y 01 en adultos mayores), de los cuales 06 son casos nuevos. Se reportan, además: 01 caso de recaída y 01 abandono recuperado en adulto. No se reportan personas fallecidas por TBC.

ZOONOSIS

En la SE 04 del presente año no se ha reportado ningún caso de rabia canina en Tumbes.

ACCIDENTES POR ANIMALES

En la SE 04 no se ha notificado casos de Loxocelismo (mordedura de araña) ni Ofidismo.

SIFILIS CONGÉNITA

En la SE 04 del 2018 no se han reportado casos.

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

Durante el mes de enero de 2017, se reportó 01 brote controlado de Infección Intrahospitalaria, identificándose y permaneciendo aún en estudio un caso de Burkholderia, (aún se espera la confirmación del INS). Se instauró nuevas medidas de bioseguridad en las zonas críticas del Hospital Regional JAMO II-2, donde participaron personal de salud y servicios generales de dicho nosocomio.

En el mes de diciembre 2017, se reportan casos de infección intrahospitalaria en los servicios de: Neonatología (Infección de CVP: 01 caso TI: 1.74 – menor que valor referencial nacional: 1.80), UCI (Neumonía VM: 12 casos TI: 10.86 – mayor que valor ref. nacional: 8.77), Ginecoobstetricia (IHO postcesárea: 11 casos TI: 0.78 menor que valor referencial nacional: 0.96 y Endometritis por parto por cesárea: 01 caso TI: 0.08 menor que valor ref. nac: 0.20) Cirugía (IHO hernioplastia inguinal: 01 caso TI: 0.07 – mayor que valor ref. nacional: 0.38). ITU (sonda vesical UCI: 01 caso TI: 0.71, Medicina 01 caso TI: 1.04).

COBERTURA DE NOTIFICACIÓN

En la SE 04 se ha logrado una notificación del 89.7% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia. Los indicadores de monitoreo contribuyen a mejorar la disposición de información oportuna y de calidad en el Sistema Regional de Vigilancia Epidemiológica, permiten el procesamiento y análisis para la toma de decisiones en la prevención y control de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica en salud pública.

DISA	CRITERIOS DE MONITOREO						PUNTAJE TOTAL
	OPORTUNIDAD	COBERTURA	CALIDAD DEL DATO	SEGUIMIENTO	REGULARIZACION	RETROINFORMACION	
DIRESA TUMBES	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	31.6	89.7

Puntaje Total	
A. 90 - 100	optimo
B. 80 - 90	bueno
C. 70 - 80	regular
D. Menos de 70	debil



INDICADORES PARA EL MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TUMBES SE 04 - 2018

DISA	CRITERIOS DE MONITOREO						PUNTAJE TOTAL
	OPORTUNIDAD	COBERTURA	CALIDAD DEL DATO	SEGUIMIENTO	REGULARIZACION	RETROINFORMACION	
Zarumilla *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Aguas Verdes *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Cuchareta Baja	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Pocitos	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Loma Saavedra	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Matapalo	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Papayal	100	100.0	100	100	100	30	89.5
La Palma *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Uña de Gato *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
El Porvenir	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Lechugal	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Pampa Grande *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Puerto Pizarro	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Andres Araujo *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Pampas de Hospital *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Cabuyal	100	100.0	100	100	100	30	89.5
El Limon	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Cruz Blanca	100	100.0	100	100	100	30	89.5
San Juan de la Virgen	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Cerro Blanco	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Grabanzal	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Corrales *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
San Isidro	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Malval	100	100.0	100	100	100	30	89.5
La Cruz *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
San Jacinto	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Rica Playa	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Vaquería	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Casa Blanqueada	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Oidor	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Zorritos *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Grau	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Cancas	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Acapulco	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Bocapan	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Barrancos	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Pajaritos	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Cañaveral	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Trigal	100	100.0	100	100	100	30	89.5
La Choza	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Capitan Hoyle	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Hospital SAGARO	100	100.0	100	100	100	30	89.5
HOSPITAL REGIONAL	100	100.0	100	100	100	100	100.0
DIRESA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	31.6	89.7