



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL

2021

S.E 09



Semana Epidemiológica

(Del 28 de Febrero al 06 de Marzo del 2021)

CONTENIDO

Malaria

Dengue

Zika

Chikungunya

Leptospirosis


EDAS, IRAS

Neumonías

Muerte Materna y Perinatal

Infecciones Intrahospitalarias

Otros Daños Sujetos a Vigilancia Epidemiológica



DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA



Versión Electrónica

www.diresatumbes.gob.pe / epitumbes@dge.gob.pe

El Boletín Epidemiológico Semanal es un producto de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Tumbes. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.



DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES

Boletín Epidemiológico Regional

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES

Presentación

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 09-2021.

La información del presente Boletín Epidemiológico procede de la notificación de 47 establecimientos de salud de la Red Regional de Epidemiología.

La Red Regional está conformada por establecimientos de la Dirección Regional de Salud Tumbes, EsSalud y otros del sector salud de la región Tumbes.

La información es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Regional de Epidemiología de Tumbes, cuya fuente es el registro semanal de enfermedades y eventos sujetos a notificación inmediata o semanal. La Semana Epidemiológica inicia el domingo de cada semana y concluye el día sábado siguiente.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Dr. Harold Leoncio **BURGOS HERRERA**
Director Regional

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

Blgo. Ricardo **GAMBOA MORAN**
Director Ejecutivo

Dr. Cesar Augusto **NOBLECILLA RIVAS**
Médico. Epidemiólogo

Dr. Luis Constantino **ARÉVALO GUERRERO**
Equipo Técnico

Mg. Wilmer J. **DAVIS CARRILLO**
Equipo Técnico

Mg. Nélda **JULCA MENDOZA**
Equipo Técnico

Ing. Jhon Cristhian **CARBAJAL CRISANTO**
Equipo Técnico

Bach. Ronald Edward **HERNÁNDEZ VARGAS**
Equipo Técnico

Lic. Sheilla Catherine **NORIEGA MARTÍNEZ**
Equipo Técnico

Comité Editor

Redacción, Edición,

Dr. César A. **NOBLECILLA RIVAS**
Bach. Ronald E. **HERNÁNDEZ VARGAS**

Diseño y Proceso de Información

Bach. Ronald Edward **HERNÁNDEZ VARGAS**
Ing. Jhon Cristhian **CARBAJAL CRISANTO**



email: epitumbes@dge.gob.pe
www.diresatumbes.gob.pe

Av. Fernando Belaunde Terry Mz. X Lt. 1-10
Urb. José Lishner Tudela
Telefax: 072 523789



Editorial

Resolución Ministerial N° 905-2020-MINSA
Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus
4 de noviembre de 2020

Aprobar la Directiva Sanitaria N° 122-MINSA/2020/CDC "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

DIRECTIVA SANITARIA N° 122 -MINSA/2020/CDC

DIRECTIVA SANITARIA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL PERÚ

I. FINALIDAD

Contribuir a la prevención y control de COVID-19 en el Perú.

II. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Establecer los lineamientos y procedimientos para la vigilancia epidemiológica de COVID-19 en el país.

2.2 ESPECÍFICOS

- Establecer los procesos, metodología e instrumentos para la vigilancia epidemiológica de COVID-19 en el país.
- Establecer los procedimientos e instrumentos para la vigilancia epidemiológica de la COVID-en pacientes hospitalizados del país.
- Establecer los procedimientos e instrumentos para la vigilancia epidemiológica de las defunciones por COVID-19 en el país.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Directiva Sanitaria es de aplicación obligatoria en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del Sector Salud, ya sean públicas o privadas, a nivel nacional; en tal sentido, incluye a las IPRESS del Ministerio de Salud, de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA), Direcciones de Salud (DISA) o las que hagan sus veces a nivel regional, del Seguro Social de Salud (ESSALUD), de las Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sistema Metropolitano de Solidaridad (SISOL) y otros servicios de salud privados.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de la Salud, y sus modificatorias.
- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.
- Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Reglamento Sanitario Internacional RSI (2005) Tercera Edición.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Definiciones generales

5.1.1 Características principales del SARS-CoV-2

- Enfermedad:** COVID-19 (Enfermedad por Coronavirus-2019).
- Agente causal:** Beta Coronavirus denominado SARS-CoV-2.
- Modos de transmisión:** Por contacto directo o estrecho sin protección entre personas infectadas y susceptibles, a través de secreciones o gotas respiratorias y aerosoles que son expedidos al

DIRECTIVA SANITARIA N° 122 -MINSA/2020/CDC

DIRECTIVA SANITARIA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL PERÚ

toser, cantar, hablar, estornudar o realizar actividad física que incremente la frecuencia respiratoria. Además, por contacto indirecto si alguien susceptible tiene contacto con un objeto o una superficie contaminados con secreciones que contengan el virus (transmisión por fómites).

La transmisión por vía aérea podría ocurrir si se realizan procedimientos generadores de aerosoles como nebulizaciones, broncoscopias, ventilación asistida, cánula de oxígeno, aspiraciones, etc.

La eliminación del virus por heces ha sido demostrada en algunos pacientes, y virus viable ha sido reportado en un número limitado de casos. Sin embargo, la ruta fecal-oral no parece ser un mecanismo de transmisión, por lo tanto, su rol y significancia aún están por determinarse.

- Periodo de incubación:** Tiempo transcurrido entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. El inicio de síntomas ocurre en promedio entre 5 a 6 días después de la infección (rango: 1 a 14 días).
- Periodo de transmisibilidad:** En la mayoría de los casos, sintomáticos desde 2 días antes del inicio de la enfermedad hasta 14 días de iniciada la enfermedad. En los pacientes graves y
- Grupos de riesgo para cuadro clínico grave y muerte:** Personas mayores de 65 años y/o personas con comorbilidades, tales como:
 - Cáncer
 - Hipertensión Arterial Refractaria
 - Enfermedades cardiovasculares graves
 - Enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis
 - EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)
 - Asma moderada o grave
 - Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
 - Obesidad grave (IMC ≥ 40 kg/m²)
 - Diabetes mellitus
 - Otros que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional frente a futuras evidencias.

Fuente: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/1322786-905-2020-minsa>



EDITORIAL

DIRECTIVA SANITARIA N° 122 -Minsa/2020/CDC

DIRECTIVA SANITARIA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL PERÚ

5.2.11 Notificación: Es la comunicación oficial que realiza el responsable de la vigilancia epidemiológica o quien haga sus veces, de cualquier unidad notificante que haya detectado o recibido, y verificado el reporte o comunicación de una enfermedad o evento sujeto a vigilancia epidemiológica. La notificación de un caso de COVID-19 es diaria.

5.3. Definiciones de caso:

5.3.1. Casos de COVID-19

5.3.1.1. Caso sospechoso de COVID-19:

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos

a. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos / síntomas:

- Malestar general
- Fiebre
- Cefalea
- Congestión nasal
- Diarrea
- Dificultad para respirar (señal de alarma)
- Pérdida del olfato (anosmia)
- Pérdida del gusto (ageusia)

b. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG; infección respiratoria aguda con fiebre o temperatura actual $\geq 38^{\circ}\text{C}$; y tos; con inicio dentro de los últimos 10 días; y que requiere hospitalización).

5.3.1.2. Caso probable de COVID-19:

Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:

a. Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso probable o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos los cuales han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de los síntomas.

b. Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos radiológicos sugestivos de COVID-19, en:

- Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior.
- Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior.
- Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, aisladas o confluentes), patrones de consolidación con o sin broncogramas aéreos.

c. Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada.

5.3.1.3. Caso confirmado sintomático de COVID-19:

- Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19, mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva
- Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección por SARS-CoV-2¹.
- Caso sospechoso o probable con prueba serológica^{2,3} (ELISA, Inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a IgM o IgM/IgG para infección por SARS-CoV-2⁴.

5.3.1.4. Caso de infección asintomática de COVID-19:

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas compatibles con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o presenta prueba antigénica positiva o prueba serológica reactiva para infección por SARS-CoV-2.

5.3.1.5. Caso de Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM) en niños y adolescentes con COVID-19 (0 – 17 años)⁵

Niños y adolescentes con fiebre desde hace 3 días o más, y dos de los criterios siguientes:

- Erupción o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies).
- Hipotensión o shock.
- Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluyendo hallazgos de Ecocardiografía o elevación de Troponina y de péptido natriurético-proBNP-).
- Evidencia de coagulopatía (a partir del TP, TPT, o valores Dímeros D elevados).
- Problemas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal).

Y Marcadores de inflamación elevados, como VSG, PCR o procalcitonina.

Y Que no exista otra causa microbiana obvia de inflamación, incluyendo la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócico o estreptocócico.

Evidencia de COVID-19 (prueba molecular, prueba de antígeno o serología positiva), o contacto con pacientes con COVID-19 confirmado, probable o sospechoso.

Ante estos casos, se deberán implementar las intervenciones de control y medidas de respuesta inmediata.

5.3.1.6. Caso descartado:

Caso sospechoso que cumple con cualquiera de las siguientes condiciones:

- Con evidencia clínica, radiológica o de laboratorio que explica otra etiología diferente a SARS-CoV-2.
- Dos resultados no reactivos para infección por SARS-CoV-2 con las pruebas serológicas, con una diferencia de siete días entre la primera y la segunda.
- Dos resultados negativos a prueba molecular con una diferencia de tres días entre la primera y la segunda, ambas dentro de los primeros 10 días del inicio de síntomas.

d. Un resultado negativo a prueba molecular o prueba antigénica dentro de los 7 días desde el inicio de los síntomas y un resultado no reactivo con una prueba serológica para infección por SARS-CoV-2 después de los 7 días de la prueba molecular.

Frente a un caso sospechoso o probable, sin esperar resultado de confirmación por laboratorio, así como en los casos confirmados, deberán implementarse las medidas de control y respuesta inmediata:

- Aislamiento y seguimiento clínico del caso
- Censo y cuarentena de contactos directos

De igual manera se procederá ante la identificación de un caso de infección asintomática.

5.3.2. Fallecidos por COVID-19:

5.3.2.1. Fallecido sospechoso por COVID-19 en investigación:

Caso sospechoso de COVID-19 que fallece y que no se puede identificar de manera certera la causa de muerte. Todos estos casos deben ser investigados.

5.3.2.2. Fallecido confirmado por COVID-19:

Caso confirmado de COVID-19 por una prueba molecular y que fallece como consecuencia de la historia natural o la

evolución clínica de la enfermedad⁶. Sin existir ningún período de recuperación completa entre la enfermedad y la muerte.

Caso probable (ver 5.3.1.2 Caso probable de COVID-19) de COVID-19 que fallece como consecuencia de la historia natural o la evolución clínica de la enfermedad y que cumple con cualquiera de los siguientes criterios:

- Tiene imagen radiográfica, ecográfica o tomográfica pulmonar compatible con COVID-19.
- Tiene una prueba antigénica positiva para infección por SARS-CoV-2
- Tiene una prueba con prueba serológica⁷ (ELISA, Inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a IgM o IgM/IgG para infección por SARS-CoV-2.
- Tiene nexo epidemiológico con un caso confirmado de COVID-19.

5.3.2.3. Fallecido compatible por COVID-19:

Caso sospechoso de COVID-19, con síntomas de IRAG, que fallece como consecuencia de la evolución clínica de la enfermedad⁸, o

Caso fallecido con certificado médico de defunción donde figura el diagnóstico de COVID-19 como causa básica de la muerte, o como causa contribuyente sin otra causa que explique la defunción, y no se cuenta con ningún resultado de laboratorio o de imágenes radiológicas⁹.

5.3.2.4. Fallecido descartado por COVID-19:

Caso sospechoso o probable que fallece y luego de ser investigado no cumple con los criterios para ser clasificado como fallecido confirmado o fallecido compatible por COVID-19.

Malaria - Región Tumbes SE 09 - 2021

Hasta la SE 09 del 2021 se ha reportado 01 caso de Malaria en la SE01_2021 perteneciente a la localidad de Loma Saavedra, distrito de Aguas Verdes y provincia de Zarumilla,

En los años 1998 y 1999 se ha reportado la mayor casuística regional de casos de malaria de 32,000 y 19,000 casos respectivamente y en el año 2012 (noviembre) se logra controlar la transmisión de malaria en toda la Región Tumbes, eliminando la ocurrencia de casos autóctonos (cero casos) durante el periodo aproximado de 06 años

En el año 2018 (entre las S.E. 18 y S.E. 52) se captan y confirman casos malaria reportándose 39 casos de malaria por Plasmodium vivax, de los cuales: 19 casos son importados en personas procedentes de Venezuela y 20 casos autóctonos (Distrito Tumbes).


En el año 2019 se reportaron 84 casos de Malaria en la región Tumbes (tasa de incidencia: 0.34 x 1000 hab), de los cuales 70 son autóctonos y proceden de Aguas Verdes (02), Corrales (08), La Cruz (01), San Juan (01), Papayal (02), Zarumilla (01) y Tumbes (55). Los casos importados (14) proceden de Venezuela.

En el 2020 se tiene un acumulado de 72 casos de M. Vivax, no habiéndose reportado ningún caso de malaria entre las SE 37 y 53.

La DIRESA viene desarrollando intervenciones de PREVENCIÓN Y CONTROL para reducir la transmisión y dispersión de la enfermedad, interviniendo las localidades focalizadas, se visitaron los pacientes con malaria, brindándose tratamiento antimalárico a los casos y colaterales.

Las condiciones y determinantes: 1. *El riego por inundación en campos de cultivos de arroz, que debe ser cambiado por riego a secas intermitentes*, 2. *Viviendas inseguras para el tránsito de vectores en gran parte de la Región, en las que debe implementarse celosías en puertas y ventanas* 3. *Resistencia del vector a insecticidas de uso en salud pública en la Región aún se mantienen favorables para su expansión, por lo que se debe estar vigilante ante la presencia de casos importados (en especial en personas migrantes) y la aparición de nuevos casos autóctonos.*

Mapa de Riesgo de Malaria según 03 últimas semanas epidemiológicas (06-08//2021) Región Tumbes



Mapa de Riesgo de Malaria- Región Tumbes SE 01-09/2021



Casos de Malaria por SE - Región Tumbes 2021 (Hasta la SE 09)

| DISTRITO | N° CASOS/SEMANA | | | | | | | | | TOTAL |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| AGUAS VERDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 1 |

Casos de malaria según procedencia periodo 2018 - 2021. REGION TUMBES

| PROCEDENCIA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | % |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| IMPORTADOS | 19 | 14 | 0 | 0 | 33 | 17 |
| AUTOCTONOS | 20 | 72 | 72 | 1 | 164 | 83 |
| TOTAL | 39 | 86 | 72 | 1 | 197 | 100 |

Malaria -Distribución según Etapa de Vida Región Tumbes 2021 (S.E 01-08)

| | Frecuencia | % |
|--------------|------------|----------------|
| Adulto | 1 | 100.00% |
| Total | 1 | 100.00% |

Malaria -casos Región Tumbes 2020 (S.E 01-09)

| DISTRITOS | TOTAL |
|-----------------------|-----------|
| AGUAS VERDES | 21 |
| CORRALES | 3 |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 1 |
| TUMBES | 8 |
| ZARUMILLA | 3 |
| Total | 36 |


Malaria -Incidencia de Casos Totales Región Tumbes SE 01-09/2021

| DISTRITO | T.I | CASOS | POBLACION |
|-----------------|-------------|----------|---------------|
| A Verdes | 0.04 | 1 | 24519 |
| Matapalo | 0.00 | 0 | 2811 |
| Casitas | 0.00 | 0 | 2339 |
| San Jacinto | 0.00 | 0 | 9421 |
| Canoas | 0.00 | 0 | 6028 |
| P de Hosp. | 0.00 | 0 | 7851 |
| La Cruz | 0.00 | 0 | 9889 |
| Zorritos | 0.00 | 0 | 13317 |
| Papayal | 0.00 | 0 | 5930 |
| Tumbes | 0.00 | 0 | 120092 |
| Corrales | 0.00 | 0 | 25907 |
| San Juan | 0.00 | 0 | 4547 |
| Zarumilla | 0.00 | 0 | 23772 |
| REGIONAL | 0.00 | 1 | 256423 |

En los tres últimos años se observa que la casuística de casos importados ha disminuido en comparación a la de casos autóctonos; en el 2020 la totalidad de casos reportados fueron autóctonos y en lo que va de este año se ha reportado un caso autóctono, lo cual evidencia que la transmisión de malaria es predominantemente local (autoctona).

Comparando la casuística de casos de malaria según procedencia distrital en el periodo de las tres primeras semanas 2020 – 2021(SE09), observamos que la focalización distrital de la transmisión se ha reducido del 38.46 % (5/13) del total de distritos para el 2020, al 7.69 % (1/13) de distritos para el 2021.

CASOS CONFIRMADOS DE MALARIA POR SEXO



La mayor incidencia de los casos se presenta en varones con el 100%.

Dengue - Región Tumbes SE 09 - 2021

En la SE 09 -2021 se han notificado 59 casos de Dengue, el 88.14% (52/59) de ellos fueron casos probables y solo el 11.86% (7/59) casos corresponden a confirmados; según cuadro clínico el 93.22% (55/59) corresponde a dengue sin signos de alarma, solo el 6.78% (4/59) casos pertenece a dengue con signos de alarma.


| CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS EN LA SE 09 | | | |
|---|----------|-----------|-----------|
| DENGUE | Conf. | Prob. | TOTAL |
| DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | 7 | 48 | 55 |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | 0 | 4 | 4 |
| DENGUE GRAVE | 0 | 0 | 0 |
| FALLECIDO | 0 | 0 | 0 |
| REGION TUMBES | 7 | 52 | 59 |

Distribución según forma clínica y SE de inicio de enfermedad reportados en SE 09 - 2021

| Diagnóstico | Semanas de Inicio de Sintomas | | | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|----|----|-------|
| | 7 | 8 | 9 | |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | 2 | 28 | 25 | 55 |

Los casos reportados, en esta semana, según inicio de enfermedad se han distribuido de la siguiente manera: el 50.85 % (30/59) a la SE 08, el 44.07 % (26/59) a la SE 09 y el 5.09 % (3/59) a la SE 07; esto corresponde al cuadro: Dengue: Distribución según forma clínica y SE de inicio de enfermedad reportados en SE 09 - 2021.

Comportamiento de Dengue SE 09-02/2021 Canal Endémico Región Tumbes



Apreciamos en el canal endémico, que la casuística semanal de casos de dengue oscila entre 12 y 23 casos, manteniéndonos en la zona epidémica, y en las tres antepenúltimas semanas existe un incremento de casos, lo cual está relacionada con la dispersión de la transmisión a otros distritos a nivel regional


Dengue -Distribución según Etapa de Vida Región Tumbes 2021 (Acumulado a la SE09)

| DISTRITO | N° CASOS/GRUPO ETAREO | | | | | | TOTAL |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | <1 año | Adolescente | Adulto | Adulto Mayor | Joven | Niño | |
| AGUAS VERDES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CANONAS DE PUNTA SAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASITAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| CORRALES | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| LA CRUZ | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| MATAPALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 24 |
| PAPAYAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SAN JACINTO | 0 | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | 30 |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| TUMBES | 0 | 12 | 46 | 6 | 28 | 22 | 114 |
| ZARUMILLA | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| ZORRITOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| TOTAL | 1 | 23 | 100 | 21 | 56 | 41 | 242 |

El acumulado durante las ocho primeras semanas es de 242 casos de dengue, correspondiendo el 41.32% (100/242) de ellos a la etapa adulto, el 23.14% (56/242) a la etapa joven, el 17.36% (42/242) a la etapa niño y el 9.50% (23/242) a la etapa adolescente. **El 84.62 % (11/13) de los distritos vienen reportando casos de Dengue.** (Cuadro; y en relación al sexo los hombres resultan ser más afectados que las mujeres (Grafico). El mayor riesgo de exposición a la picadura por Aedes aegypti, de la población según etapa de vida y sexo probablemente se relaciona por una mayor permanencia en ambientes domiciliarios o públicos que están infestados por este vector".

La población y autoridades distritales deben priorizar sus actividades de prevención y control.

Comportamiento de Dengue años 2014 - 2021 Región Tumbes




En el último quinquenio la tendencia de casos muestra una discreta disminución con periodos epidémicos de entre 1000 y 7000 casos como promedio al año, con mayor actividad epidémica en el primer semestre del año.

En el 2021 los departamentos que han reportado mayor número de casos de dengue son Loreto, San Martín, Huanuco, Ucayali y Madre de Dios. Incrementándose la casuística nacional de lo que del presente año en un 70.6 % de casos de dengue.

Número de Casos de dengue según departamentos Perú 2015-2021*


| Departamentos | Años | | | | | | Corte Hasta la SE 07 | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
| LORETO | 1696 | 1089 | 1833 | 2548 | 9824 | 2082 | 168 | 221 | 258 | 777 | 2358 | 2082 | |
| SAN MARTIN | 335 | 460 | 98 | 1969 | 5251 | 1432 | 40 | 89 | 9 | 60 | 896 | 1432 | |
| HUANUCO | 728 | 92 | 25 | 35 | 1614 | 1215 | 261 | 34 | 3 | 3 | 8 | 1215 | |
| UCAYALI | 1007 | 779 | 317 | 214 | 9943 | 1162 | 219 | 308 | 209 | 12 | 190 | 1162 | |
| MADRE DE DIOS | 468 | 565 | 1234 | 7399 | 3425 | 633 | 201 | 33 | 465 | 240 | 2047 | 633 | |
| JUNIN | 931 | 220 | 51 | 481 | 4130 | 619 | 424 | 46 | 0 | 30 | 381 | 619 | |
| AMAZONAS | 90 | 93 | 109 | 164 | 874 | 536 | 19 | 1 | 53 | 3 | 69 | 536 | |
| AYACUCHO | 2638 | 1657 | 202 | 95 | 1592 | 486 | 655 | 221 | 14 | 59 | 8 | 486 | |
| CUSCO | 1100 | 537 | 79 | 54 | 2506 | 314 | 166 | 198 | 20 | 4 | 231 | 314 | |
| CAJAMARCA | 281 | 420 | 6 | 399 | 268 | 233 | 63 | 66 | 1 | 12 | 3 | 233 | |
| ICA | 323 | 4384 | 127 | 51 | 7174 | 185 | 1 | 295 | 14 | 5 | 14 | 185 | |
| TUMBES | 1089 | 4145 | 64 | 508 | 3135 | 140 | 55 | 107 | 28 | 1 | 330 | 140 | |
| PASCO | 50 | 4 | 3 | 36 | 379 | 98 | 16 | 3 | 1 | 0 | 26 | 98 | |
| PIURA | 7610 | 44275 | 525 | 70 | 144 | 91 | 712 | 579 | 117 | 3 | 17 | 91 | |
| LIMA | 58 | 362 | 11 | 46 | 362 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| LA LIBERTAD | 4650 | 5904 | 3 | 366 | 464 | 5 | 354 | 219 | 2 | 56 | 44 | 5 | |
| CALLAO | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LAMBAYEQUE | 1662 | 1579 | 4 | 770 | 569 | 1 | 378 | 119 | 3 | 7 | 69 | 1 | |
| MOQUEGUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUANCAVELICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AREQUIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANCASH | 454 | 1720 | 6 | 20 | 0 | 0 | 47 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| APURIMAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLUNO | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Perú | 25160 | 68290 | 4698 | 15290 | 51678 | 9240 | 3782 | 2559 | 1203 | 1283 | 6713 | 9240 | |

Fuente: CDC -Minsa Perú. www.dge.gob.pe. Sala Situacional SE07 -2021




| REGION TUMBES | GRUPO DE EDAD | | | | |
|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | NIÑO | ADOLESC. | JOVEN | ADULTO | ADULTO MAYOR |
| % | 17.36 | 9.50 | 23.14 | 41.32 | 8.68 |
| Casos | 42 | 23 | 56 | 100 | 21 |

INCIDENCIA ACUMULADA POR DISTRITOS, DENGUE - REGION TUMBES PERIODO 2021 HASTA S.E 09



Mapa de Riesgo de la SE 06-08/2021 (Tres últimas semanas)



La tasa de Incidencia Regional a la SE09 del presente año (2021) es de 0.94 casos por 1000 hab., menor que el año 2020 que fue de 1.80 casos por 1000 hab. Los distritos de San Jacinto, Pampas de Hospital, San Juan presentan y Casitas tasas de incidencia superior a la de la región

Tasa de incidencia distrital de Dengue a la S.E. 09 según Distrito Región Tumbes – Periodo 2020-2021

Comparando la casuística de casos de dengue reportado en las nueve primeras semanas del periodo 2020 y 2021, se observa en el presente año una disminución del 53.42 % (242/453) de casos reportados en relación al año anterior (453 casos).

Casos de Dengue Notificados por Diagnóstico y Clasificación de Dengue (Hasta la SE 08 /2021)


| DENGUE | Conf. | Prob. | TOTAL |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | 32 | 199 | 231 |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | 5 | 5 | 10 |
| DENGUE GRAVE | 0 | 1 | 1 |
| FALLECIDO | 0 | 0 | 0 |
| REGION TUMBES | 37 | 205 | 242 |

| Distritos | 2020 | | | 2021 | | | Tendencia Casos 6 últimas semanas |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | casos | % | TIA 1000 Hab. | casos | % | TIA 1000 Hab. | |
| TUMBES | 169 | 37.31 | 1.43 | 114 | 47.11 | 0.95 | |
| ZARUMILLA | 41 | 9.05 | 1.77 | 16 | 6.61 | 0.67 | |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 10 | 2.21 | 1.31 | 24 | 9.92 | 3.06 | |
| AGUAS VERDES | 14 | 3.09 | 0.58 | 1 | 0.41 | 0.04 | |
| ZORRITOS | 9 | 1.99 | 0.69 | 13 | 5.37 | 0.98 | |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 8 | 1.77 | 1.79 | 11 | 4.55 | 2.42 | |
| PAPAYAL | 42 | 9.27 | 7.13 | 4 | 1.65 | 0.67 | |
| CANOAS DE PUNTA SAL | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| CORRALES | 3 | 0.66 | 0.12 | 9 | 3.72 | 0.35 | |
| SAN JACINTO | 1 | 0.22 | 0.11 | 30 | 12.40 | 3.18 | |
| MATAPALO | 155 | 34.22 | 56.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| LA CRUZ | 1 | 0.22 | 0.10 | 16 | 6.61 | 1.62 | |
| CASITAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1.65 | 1.71 | |
| Región Tumbes | 453 | 100.00 | 1.80 | 242 | 100.00 | 0.94 | |



De los 242 casos de dengue notificados, el 85% (205) son casos probables y el 15% (37) se han confirmado. Del total de los casos el 96% (231/242) corresponde a dengue sin signos de alarma; solo el 4.13% (10/242) corresponde a dengue con signos de alarma.

Los períodos lluviosos que se han ido presentando, escasos servicios de saneamiento básico, acúmulo de inservibles, índices ácidos elevados, aunado a la pobre respuesta en salud, bajo autocuidado de la población y débil involucramiento de los actores sociales para la solución de la problemática sanitaria y casos confirmados de Dengue tanto al sur (Piura) como al norte (Ecuador) de la Región, **nos sitúa en RIESGO permanente para la transmisión de Dengue**. Es importante intervenir de manera multisectorial y con un enfoque clave de Gestión Territorial, para asegurar un abordaje integral con todos los actores sociales que influyen en las determinantes sociales de la salud.

El *Aedes aegypti* se encuentra disperso en los 13 distritos (100%) de la Región Tumbes, como podemos ver en la tabla las Tasas de Incidencia se han ido incrementando para los distritos de Tumbes, La Cruz, Zarumilla, Aguas Verdes, Zorritos.



| DISTRITOS | 14A120FEB21 | 21A127FEB21 | 08FEB1603MAR21 | TOTAL |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| AGUAS VERDES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANOAS DE PUNTA SAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRALES | 1 | 5 | 2 | 8 |
| LA CRUZ | 0 | 6 | 2 | 8 |
| MATAPALO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 10 | 3 | 4 | 17 |
| PAPAYAL | 1 | 2 | 1 | 4 |
| SAN JACINTO | 3 | 19 | 4 | 26 |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 4 | 0 | 5 | 9 |
| TUMBES | 11 | 10 | 8 | 29 |
| ZARUMILLA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| ZORRITOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CASITAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL REGIONAL | 35 | 46 | 25 | 107 |



En la tres últimas semanas, los distritos que no han reportado casos de dengue son Canoas de Punta Sal, Casitas y Matapalo que representan 23.08 % (3/13) de total de distritos. En esta última semana, los casos reportados proceden de los distritos de la Provincia Tumbes.

Chikungunya - Región Tumbes 09 - 2021

A la SE 09_2021 se han registrado 04 casos confirmados de chikungunya del distrito de Tumbes y San Juan de la Virgen correspondientes a la etapa adolescente, adulto y adulto mayor.

En el 2020 el acumulado fue de 05 casos confirmados de virus Chikungunya, procedente de los distritos de Tumbes (2), San Juan (1), Zarumilla (1) y Aguas Verdes (1),

Casos de Fiebre por virus Chikungunya por procedencia Región Tumbes (SE 01 - 09/2021)


| Diagnóstico | Distrito | Confirmados | | Probable | | Total | TIA |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | Nº | TIA | Nº | TIA | | |
| FIEBRE DE CHIKUNGUNYA | SAN JUAN DE LA VIRGEN | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0.22 |
| | TUMBES | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 3 | 0.02 |
| REGION TUMBES | | 4 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | 0.02 |

Casos de Fiebre por virus Chikungunya por Grupos de Edad del año 2021 (SE 01 - 09) DIRESA TUMBES.

| | Frecuencia | % |
|----------------------|------------|----------------|
| Adolescente | 1 | 25.00% |
| Adulto | 2 | 50.00% |
| Adulto Mayor | 1 | 25.00% |
| Total general | 4 | 100.00% |

Según etapa de vida, los casos reportados hasta la SE 09, correspondieron el 50% a los adultos (2/4) y solo el 25% corresponden a los adolescentes (1/4) y adultos mayores

Mapa de Riesgo de Fiebre por virus Chikungunya Región Tumbes año 2021 (SE 01 - 09)



Casos de Fiebre por virus Chikungunya por procedencia Región Tumbes año 2020

| | Frecuencia | % |
|-----------------------|------------|----------------|
| AGUAS VERDES | 1 | 20.00% |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 1 | 20.00% |
| TUMBES | 2 | 40.00% |
| ZARUMILLA | 1 | 20.00% |
| Total | 5 | 100.00% |

A nivel nacional, desde la SE 01 hasta la SE 07 del 2021, se ha notificado 28 casos de chikungunya en el país, no se reportaron fallecidos.


| Departamentos | 2019 | | | 2020 | | | 2021* | | | Casos en la SE 07 2021 |
|---------------|-------|--------|------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|------------------|------------------------|
| | casos | % | TIA 100 000 Hab. | casos | % | TIA 100 000 Hab. | casos | % | TIA 100 000 Hab. | |
| PIURA | 78 | 79.59 | 4.10 | 63 | 55.75 | 3.08 | 8 | 28.57 | 0.39 | 0 |
| SAN MARTIN | 9 | 9.18 | 1.02 | 32 | 28.32 | 3.56 | 19 | 67.86 | 2.11 | 0 |
| LORETO | 4 | 4.08 | 0.37 | 5 | 4.42 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| MADRE DE DIOS | 2 | 2.04 | 1.33 | 3 | 2.65 | 1.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| TUMBES | 2 | 2.04 | 0.80 | 5 | 4.42 | 1.99 | 1 | 3.57 | 0.40 | 0 |
| JUNIN | 1 | 1.02 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| AYACUCHO | 1 | 1.02 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| LAMBAYEQUE | 1 | 1.02 | 0.14 | 1 | 0.88 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| UCAYALI | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2.65 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| LIMA | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.88 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Perú | 98 | 100.00 | 0.31 | 113 | 100.00 | 0.35 | 28 | 100.00 | 0.09 | 0 |

Fuente: CDC - Minsa Perú. www.dge.gob.pe. Sala Situacional SE 07-2021

Mapa de Riesgo de Chikungunya según 03 últimas semanas epidemiológicas (06-08/2021) Región Tumbes



Fiebre por virus Chikungunya Región Tumbes 2015-2021



Se interviene la Región con la aplicación de Piriproxifen en "motitas" (control larvario), las que se cuelgan en los depósitos de agua mediante un nylon, los cuales debe de conservarse por 03 meses, se realiza búsqueda en campo (casa por casa) de personas que puedan tener Dengue, Chikungunya o Zika, para la intervención oportuna con control larvario o fumigación (última barrera de acción).

Casos de Fiebre por virus Chikungunya - Región Tumbes año 2018

| Diagnóstico | Distrito | Confirmados | | Probable | | Total | TIA |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| | | Nº | TIA | Nº | TIA | | |
| FIEBRE DE CHIKUNGUNYA | CORRALES | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 0.04 |
| | LA CRUZ | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 |
| | PAPAYAL | 2 | 0.37 | 0 | 0.00 | 2 | 0.37 |
| | TUMBES | 7 | 0.06 | 0 | 0.00 | 7 | 0.06 |
| REGION TUMBES | | 11 | 0.05 | 0 | 0.00 | 11 | 0.05 |

La tendencia de los casos de chikungunya desde su aparición a la actualidad es descendente.

Zika - Región Tumbes SE09 - 2021


Mapa de Riesgo de Fiebre por virus Zika Región Tumbes SE 09-2021



Mapa de Riesgo de Zika según 03 últimas semanas epidemiológicas (06-08/2021) - Región Tumbes



Casos por virus Zika Región Tumbes 2016- 2021 (SE09)



La tendencia de los casos de Zika desde su aparición a la actualidad es descendente.

Hasta la **SE 09/2021 NO** se han presentado casos sospechosos ni confirmados de ZIKA.

Pero cabe resaltar que, en el año 2019, en la SE 52, teníamos registrados 20 casos sospechosos de Zika los cuales han sido descartados teniendo en cuenta la investigación, resultados de laboratorio y clasificación final; de estas 18 gestantes han resultado positivas a leptospirosis según IGM+. En la S.E 50 se ha reportado 01 caso sospechoso de zika en una gestante de 24 años de edad, procedente de Tumbes. En el 2018 se notificaron 31 casos en gestantes, los cuales fueron descartados por laboratorio. Durante el año 2017 se reportaron 18 gestantes afectadas por el virus Zika, de las cuales todas tuvieron sus partos (se detectaron 02 casos de microcefalia asociado a Zika).

Se recomienda: Evitar salir embarazadas, hasta que la epidemia de Zika se controle, proteger sus casas con celosías en puertas y ventanas para evitar que se contagien por el virus Zika.

Se reportó en el 2017 el primer caso de Síndrome de Guillain Barré asociado a un caso Zika confirmado. En lo que va del 2018 y 2019 no se han reportado casos de Síndrome de Guillain Barré asociado a Zika.

Número de casos y tasa de incidencia por zika según Departamentos Perú 2018-2021*

| Departamentos | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021* | | |
|---------------|-------|--------|------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|------------------|
| | casos | % | TIA 100 000 Hab. | casos | % | TIA 100 000 Hab. | casos | % | TIA 100 000 Hab. | casos | % | TIA 100 000 Hab. |
| CAJAMARCA | 7 | 0.77 | 0.46 | 1997 | 85.16 | 129.41 | 4 | 3.31 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HUANUCO | 10 | 1.11 | 1.16 | 209 | 8.91 | 23.51 | 3 | 2.48 | 0.39 | 2 | 7.41 | 0.26 |
| LAMBAYEQUE | 0 | 0.00 | 0.00 | 52 | 2.22 | 4.00 | 1 | 0.83 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PIURA | 264 | 28.20 | 13.97 | 36 | 1.54 | 1.89 | 9 | 7.44 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| LORETO | 171 | 18.92 | 15.74 | 23 | 0.98 | 2.13 | 27 | 22.31 | 2.63 | 5 | 18.52 | 0.48 |
| AMAZONAS | 278 | 30.75 | 64.41 | 9 | 0.38 | 2.11 | 5 | 4.13 | 1.17 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SAN MARTIN | 20 | 2.21 | 2.26 | 7 | 0.30 | 0.79 | 34 | 28.10 | 3.78 | 20 | 74.07 | 2.21 |
| ICA | 19 | 2.10 | 2.29 | 6 | 0.26 | 0.73 | 2 | 1.65 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| UCAYALI | 129 | 14.27 | 23.85 | 4 | 0.17 | 0.77 | 18 | 14.88 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IA LIBERTAD | 2 | 0.22 | 0.10 | 1 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| LIMA | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.04 | 0.01 | 1 | 0.83 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| CUSCO | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.83 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| TUMBES | 1 | 0.11 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 | 13.22 | 6.36 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| AYACUCHO | 1 | 0.11 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ANCASH | 2 | 0.22 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Perú | 904 | 100.00 | 2.84 | 2345 | 100.00 | 7.32 | 121 | 100.00 | 0.37 | 27 | 100.00 | 0.08 |

Fuente: CDC - MINSa Perú. www.dge.gob.pe. Sala Situacional SE 07-2021

Casos y tasa de Incidencia de Zika Región Tumbes año 2019

| Diagnóstico | Distrito | Confirmados | | Sospechoso | | Total | TIA |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | | Nº | TIA | Nº | TIA | | |
| ZIKA | TUMBES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ZIKA GESTANTES | CANOAS DE PUNTA SAL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | SAN JUAN DE LA VIRGEN | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | ZORRITOS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | PAMPAS DE HOSPITAL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | TUMBES | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| REGION TUMBES | | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |

Los primeros casos de zika fueron captados en los EESS como dengue y fueron procesados para zika por diagnóstico diferencial de dengue. Es necesario continuar fortaleciendo la vigilancia de gestantes con zika, así como también la toma de muestras oportunas a los recién nacidos de madres confirmadas a zika en la gestación y de casos con síndrome congénito.

Leptospirosis y Rickettsiosis - Región Tumbes SE09 - 2021


A la SE 09_2021 se ha registrado 1 caso probable perteneciente al distrito de Tumbes.

Durante el 2020 el acumulado fue de 98 casos probables, no habiéndose reportado ningún caso entre las SE 48 y 53.


La tasa de incidencia regional de leptospirosis fue de 0.39 casos por 1000 hab, valor superior a la alcanzada en el 2019 que fue de 0.23 por mil habitantes.

Las condiciones en la Región como la humedad, las deficiencias higiénicas que ocasionan infección por roedores y poblaciones no controladas de perros, afloramiento de desagües y otras favorecen la aparición y persistencia de los casos.

Comportamiento de la Leptospirosis en periodo 2014 – 2021 (SE09) Región Tumbes.



INCIDENCIA POR DISTRITOS DE LEPTOSPIROSIS REGIÓN TUMBES 2021 (SE 09)



Casos, tasas de incidencia Leptospirosis. Perú 2016 -SE 07-2021*

Fuente: CDC Sala Situacional SE 07-2021

| Departamentos | Años | | | | | | Corte hasta la SE 07 | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|----------------------|------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| MADRE DE DIOS | 1002 | 181 | 154 | 2229 | 825 | 394 | 141 | 18 | 52 | 45 | 354 | 394 |
| LORETO | 430 | 708 | 1005 | 3052 | 5053 | 99 | 37 | 122 | 105 | 215 | 1354 | 99 |
| SAN MARTIN | 48 | 172 | 36 | 100 | 184 | 65 | 10 | 26 | 10 | 15 | 53 | 65 |
| UCAYALI | 88 | 182 | 61 | 70 | 343 | 18 | 3 | 99 | 19 | 7 | 36 | 18 |
| CAJAMARCA | 27 | 57 | 56 | 67 | 42 | 7 | 6 | 37 | 15 | 11 | 4 | 7 |
| JUNIN | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| PIURA | 9 | 279 | 203 | 202 | 141 | 5 | 2 | 32 | 14 | 30 | 46 | 5 |
| AYACUCHO | 238 | 377 | 356 | 342 | 421 | 5 | 22 | 65 | 48 | 80 | 46 | 5 |
| AMAZONAS | 11 | 18 | 17 | 33 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| LIMA | 25 | 66 | 40 | 73 | 18 | 3 | 2 | 15 | 4 | 13 | 6 | 3 |
| CALLAO | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TUMBES | 29 | 643 | 256 | 151 | 90 | 1 | 2 | 34 | 20 | 35 | 43 | 1 |
| CUSCO | 65 | 95 | 95 | 83 | 199 | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 | 82 | 1 |
| PASCO | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| APURIMAC | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOQUEGUA | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LAMBAYEQUE | 27 | 189 | 104 | 138 | 111 | 0 | 6 | 13 | 9 | 33 | 33 | 0 |
| HUANUCO | 20 | 110 | 31 | 91 | 35 | 0 | 3 | 20 | 6 | 5 | 13 | 0 |
| PUNO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANCASH | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TACNA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREQUIPA | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ICA | 1 | 150 | 63 | 13 | 7 | 0 | 0 | 30 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| HUANCAVELICA | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LA LIBERTAD | 13 | 53 | 14 | 34 | 20 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| Perú | 2063 | 3321 | 2521 | 6724 | 7532 | 609 | 242 | 530 | 335 | 525 | 2106 | 609 |

En el 2020, según etapa de vida los más afectados resultaron ser joven en un 38.78% y adultos en un 36.73% siendo los menos afectados el adulto mayor y niño en un 8.16% y 4.08% respectivamente.

Cabe resaltar que el grado de exposición a factores de riesgo de contaminación, juega un rol preponderante en la medida que se expone el individuo.

Casos Acumulados de Leptospirosis por Grupos de Etapa de Vida Región Tumbes año 2020

| Etapa de Vida | Frecuencia | % |
|----------------------|------------|----------------|
| Adolescente | 12 | 12.24% |
| Adulto | 36 | 36.73% |
| Adulto Mayor | 8 | 8.16% |
| Joven | 38 | 38.78% |
| Niño | 4 | 4.08% |
| Total general | 98 | 100.00% |

Casos de Leptospirosis Región Tumbes año 2020


| Categoría | Frecuencia | % |
|----------------------|------------|----------------|
| Probables | 98 | 100.00% |
| Total general | 98 | 100.00% |

Tasa de incidencia distrital de Leptospirosis - Región Tumbes año 2020

| DISTRITO | T.I | CASOS | POBLACION |
|-----------------------|-------------|-----------|---------------|
| Casitas | 0.00 | 0 | 2288 |
| Canoas Punta Sal | 0.00 | 0 | 5921 |
| Zorritos | 0.08 | 1 | 13053 |
| La Cruz | 0.10 | 1 | 9541 |
| San Jacinto | 0.11 | 1 | 9155 |
| Aguas Verdes | 0.21 | 5 | 24222 |
| San Juan de la Virgen | 0.22 | 1 | 4469 |
| Corrales | 0.28 | 7 | 25261 |
| Zarumilla | 0.30 | 7 | 23179 |
| REGIONAL | 0.39 | 98 | 251521 |
| Tumbes | 0.40 | 47 | 118158 |
| Papayal | 0.85 | 5 | 5887 |
| Pampas de Hospital | 1.05 | 8 | 7624 |
| Matapalo | 5.43 | 15 | 2763 |

El distrito que presentó la mayor Tasa de Incidencia en el 2020 fue Matapalo seguido de Pampas den Hospital, con tasas de incidencias de TI 5.43 por mil habitantes, TI de 1.05 por mil habitantes respectivamente.

Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas SE (06-08)/2021 - Región Tumbes



Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), Neumonías y SOB - Región Tumbes SE09 - 2021


En la SE09 del presente año se han notificado a nivel regional 75 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, no se ha notificado casos de NEUMONIAS, no se notificaron casos de NEUMONIA GRAVE.

La tasa de incidencia acumulada regional de IRAS en <05 años a la SE 09 las T.I por IRAs a nivel Regional es de 27.29 por mil hab. Según distritos tenemos que el 130.94 por mil hab. corresponde a San Jacinto; 125.83 corresponde a Casitas seguido de Papayal con un 88.41 por mil hab. Luego los distritos que menos T.I son Zarumilla con el 9.21 y Matapalo con el 0.00 por mil hab.


En la SE09 no se reportan fallecidos por IRAs. La tasa de letalidad es de 0.00 en <5 años.

La variación irregular de la temperatura aumentaría el riesgo de la presencia de Neumonías y Neumonías Graves por lo que es preciso mantener la vigilancia y la adecuada atención de los pacientes y evitar sus complicaciones. Estableciendo priorización en los distritos de mayor riesgo: Papayal, San Jacinto y Pampas de Hospital.


Incidencia acumulada distrital de IRAs en menores de 5 años Región Tumbes 2021 (SE09)



Mapa de Riesgo de IRAs en menores de 5 años según 03 últimas semanas epidemiológicas SE 06-08 -2021



Comportamiento de IRAs SE (01-09) – 2021 Canal Endémico Región Tumbes



TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE IRAS SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN

| DISTRITO | T.I | CASOS | POBLACION |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| SAN JACINTO | 130.94 | 91 | 695 |
| CASITAS | 125.83 | 19 | 151 |
| PAPAYAL | 88.41 | 58 | 656 |
| LA CRUZ | 48.13 | 40 | 831 |
| AGUAS VERDES | 47.23 | 103 | 2181 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 46.51 | 32 | 688 |
| CORRALES | 36.16 | 81 | 2240 |
| ZORRITOS | 30.97 | 35 | 1130 |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 28.65 | 11 | 384 |
| CANOA DE PUNTA SAL | 21.84 | 14 | 641 |
| ZARUMILLA | 11.62 | 24 | 2065 |
| TUMBES | 9.21 | 91 | 9877 |
| MATAPALO | 0.00 | 0 | 411 |
| REGIONAL | 27.29 | 599 | 21950 |

N° DE CASOS < 05 AÑOS SEGÚN TIPO DE DIAGNOSTICO EN LA REGION TUMBES (SE 01-09 /2021).

| DIAGNOSTICO | N° CASOS/SEMANA | | | | | | | | | TOTAL |
|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Suma de IRA | 73 | 67 | 61 | 64 | 62 | 62 | 64 | 72 | 74 | 599 |
| Suma de NEUMONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma de NEUMONIA_GRAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma de SOB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 73 | 67 | 63 | 64 | 62 | 62 | 64 | 72 | 75 | 602 |

En la SE09/2021, se notificaron 75 casos, en Total hasta la SE 09 el 99.50% (599/602) corresponde a IRAs y solo el 0.17% corresponden a Neumonias (1/602) y el 0.33% a SOB (2/602).

El análisis del canal endémico de IRAs, muestra que en la SE09 del presente año estamos en la zona de EXITO.

Uno de los principales problemas implica las inadecuadas prácticas de higiene, considerando además que se suman determinantes sociales que agravan las condiciones de vida de población susceptible; la escasas y poca disponibilidad de agua es un factor preponderante, limitando las condiciones básicas de lavado de manos, que es una de las practicas claves para reducir en más del 60% el problema de contagio por IRAs.




Mapa de Riesgo de Influenza A H1N1 – año 2020
Región Tumbes

A la SE 09_2021 no se registraron casos de influenza A H1N1.

En el 2020, se tuvo un acumulado de 08 casos confirmados de influenza A H1N1 pdm, procedentes de los distritos de Tumbes, San Juan de la Virgen y Zarumilla.

La tasa de incidencia regional alcanzada fue de 0.03 casos de Influenza por cada mil habitantes, no se registraron casos entre las SE 12 y 53.


El distrito de San Juan presentó la más alta tasa, y se recomendó fortalecer las actividades de prevención como adecuado lavado de manos, medidas de higiene al toser o estornudar y realizar la vacunación en grupos de riesgo.



Tasa de incidencia distrital de Influenza AH1N1 - Región Tumbes año 2020

| Distrito | Confirmados | |
|---------------------|-------------|-------------|
| | Nº | TIA |
| AGUAS VERDES | 0 | 0.00 |
| CANOAS DE PUNTA SAL | 0 | 0.00 |
| CASITAS | 0 | 0.00 |
| CORRALES | 0 | 0.00 |
| LA CRUZ | 0 | 0.00 |
| MATAPALO | 0 | 0.00 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 0 | 0.00 |
| PAPAYAL | 0 | 0.00 |
| SAN JACINTO | 0 | 0.00 |
| SAN JUAN | 1 | 0.23 |
| TUMBES | 2 | 0.02 |
| ZARUMILLA | 5 | 0.21 |
| ZORRITOS | 0 | 0.00 |
| REGIONAL | 8 | 0.03 |

Mapa de Riesgo de Influenza A H1N1 según 03 últimas semanas epidemiológicas 2020 (51-53) - Región Tumbes





COVID-19

SE 01-09/2021


159 FALLECIDOS **5.0%** LETALIDAD

*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados


| FALLECIDOS SEGÚN CLASIFICACION | | |
|--------------------------------|------------|----------------|
| Clasificación | Casos | % |
| Confirmados | 117 | 72.36% |
| Sospechoso | 7 | 3.48% |
| Probable | 35 | 24.15% |
| Total general | 159 | 100.00% |

Durante el presente año hasta SE 09 del 2021 se han reportado en nuestra región, según su clasificación 3210 casos confirmados, 3657 casos siguen como sospechosos, 1083 casos siguen como probables y 159 han fallecido (117 confirmados, 7 sospechosos y 35 probables).

| DISTRITOS/CONFIRMADO | sexo | | Total |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| | Fem | Mas | |
| AGUAS VERDES | 22 | 43 | 65 |
| CANOA DE PUNTA SAL | 22 | 35 | 57 |
| CORRALES | 128 | 121 | 249 |
| PAPAYAL | 20 | 21 | 41 |
| SAN JACINTO | 24 | 51 | 75 |
| TUMBES | 1115 | 1169 | 2284 |
| ZARUMILLA | 70 | 94 | 164 |
| ZORRITOS | 23 | 59 | 82 |
| MATAPALO | 1 | 2 | 3 |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 16 | 26 | 42 |
| LA CRUZ | 26 | 37 | 63 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 36 | 44 | 80 |
| CASITAS | 4 | 1 | 5 |
| 1507 | 1703 | 3210 | |




| DISTRITOS/PROBABLE | sexo | | Total |
|-----------------------|------------|-------------|-------|
| | Fem | Mas | |
| AGUAS VERDES | 6 | 7 | 13 |
| CANOA DE PUNTA SAL | 8 | 16 | 24 |
| CORRALES | 25 | 21 | 46 |
| PAPAYAL | 6 | 4 | 10 |
| SAN JACINTO | 14 | 10 | 24 |
| TUMBES | 439 | 362 | 801 |
| ZARUMILLA | 33 | 33 | 66 |
| ZORRITOS | 23 | 22 | 45 |
| MATAPALO | 1 | 1 | 2 |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 5 | 5 | 10 |
| LA CRUZ | 11 | 6 | 17 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 14 | 10 | 24 |
| CASITAS | 1 | 1 | 2 |
| 586 | 497 | 1083 | |



| DISTRITOS/SOSPECHOSO | sexo | | Total |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| | Fem | Mas | |
| AGUAS VERDES | 11 | 25 | 36 |
| CANOA DE PUNTA SAL | 42 | 27 | 69 |
| CORRALES | 133 | 120 | 253 |
| PAPAYAL | 24 | 14 | 38 |
| SAN JACINTO | 29 | 27 | 56 |
| TUMBES | 1401 | 1411 | 2812 |
| ZARUMILLA | 66 | 64 | 130 |
| ZORRITOS | 46 | 40 | 86 |
| MATAPALO | 1 | 2 | 3 |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 16 | 12 | 28 |
| LA CRUZ | 32 | 28 | 60 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 51 | 29 | 80 |
| CASITAS | 3 | 4 | 7 |
| 1855 | 1802 | 3657 | |

| DISTRITOS/DEFUNCIONES | sexo | | Total |
|-----------------------|-----------|------------|-------|
| | Fem | Mas | |
| AGUAS VERDES | 2 | 3 | 5 |
| CANOA DE PUNTA SAL | 4 | 7 | 11 |
| CORRALES | 7 | 15 | 22 |
| PAPAYAL | 1 | 1 | 2 |
| SAN JACINTO | 5 | 4 | 9 |
| TUMBES | 31 | 46 | 77 |
| ZARUMILLA | 6 | 5 | 11 |
| ZORRITOS | 4 | 7 | 11 |
| LA CRUZ | 6 | 6 | 12 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 2 | 3 | 5 |
| CASITAS | 1 | 1 | 2 |
| 61 | 98 | 159 | |



ANTECEDENTES COVID 19 (2020 - 2021)

881 FALLECIDOS **2.5 %** LETALIDAD


*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

| FALLECIDOS SEGÚN CLASIFICACION | | |
|--------------------------------|------------|----------------|
| Clasificación | Casos | % |
| Confirmados | 601 | 72.79% |
| Sospechosos | 245 | 14.43% |
| Probable | 35 | 12.78% |
| Total general | 881 | 100.00% |

Desde el mes de marzo del 2020 hasta la SE 09 2021, se han reportado en nuestra región, según su clasificación 24735 casos confirmado, 27461 se han descartado, 9949 casos siguen como sospechosos, 1261 casos siguen como probables, 1701 fueron hospitalizados, 17198 se han recuperado y 881 han fallecido (601 confirmados, 245 sospechosos y 35 probables).

Han fallecido en los distritos de: Tumbes 498 casos (134 adultos, 355 adultos mayores, 02 adolescente, 01 niño y 6 jóvenes); de Corrales 100 casos (27 adultos, 71 adultos mayores, 1 jóvenes y 1 adolescente); de Zarumilla 74 casos (20 adultos, 53 adultos mayores y 01 niño); de Zorritos 52 casos (11 adulto, 39 adultos mayores y 02 jóvenes); de Aguas Verdes 48 casos (19 adultos y 29 adultos mayores); de Canoas de Punta Sal 26 casos (07 en adultos y 18 casos en adultos mayores); de La Cruz 26 casos (10 adultos y 16 adultos mayores); San Jacinto 19 casos (01 en jóvenes, 03 en adulto y 15 en adulto mayor); Papayal 15 casos (02 jóvenes, 03 en adulto y 10 en adultos mayores); Pampas de Hospital 08 casos (06 en adulto mayor y 02 en adultos); San Juan 08 casos (03 en adultos y 05 en adultos mayores); Casitas 06 (02 en adultos y 04 en adulto mayor); Matapalo 01 caso en adulto mayor.


| DISTRITO RESIDENCIA | CONFIRMADO | DESCARTADO | SOSPECHOSO | PROBABLE | DEFUNCIONES | HOSPITALIZADOS | RECUPERADOS |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| AGUAS VERDES | 1098 | 859 | 200 | 14 | 48 | 92 | 947 |
| CANOA DE PUNTA SAL | 211 | 80 | 233 | 24 | 26 | 20 | 114 |
| CORRALES | 1963 | 2324 | 995 | 51 | 100 | 165 | 1353 |
| PAPAYAL | 581 | 344 | 100 | 10 | 15 | 27 | 465 |
| SAN JACINTO | 389 | 442 | 182 | 26 | 19 | 45 | 268 |
| TUMBES | 15961 | 17149 | 6802 | 954 | 498 | 998 | 10817 |
| ZARUMILLA | 1970 | 2097 | 458 | 69 | 74 | 139 | 1504 |
| ZORRITOS | 723 | 1064 | 354 | 46 | 52 | 97 | 504 |
| MATAPALO | 101 | 64 | 21 | 1 | 1 | 3 | 91 |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 206 | 306 | 91 | 12 | 8 | 22 | 136 |
| LA CRUZ | 780 | 998 | 264 | 18 | 26 | 58 | 538 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 372 | 679 | 175 | 25 | 8 | 26 | 283 |
| CASITAS | 27 | 58 | 21 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| OTRAS REGIONES DEL PERU | 277 | 406 | 50 | 6 | 0 | 1 | 156 |
| ECUADOR | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24735 | 27461 | 9949 | 1261 | 881 | 1701 | 17198 |



* Se han confirmado 10143 casos que se encontraban asintomáticos que no están considerado en la gráfica

El 98.86% son casos autóctonos (24452), del total de casos (24735) confirmados de COVID19.


Tendencia de Casos confirmados de COVID 19, según inicio de síntomas






COVID-19


CASOS CONFIRMADOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD



CASOS CONFIRMADOS POR SEXO



FALLECIDOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD




FALLECIDOS SEGUN GRUPO DE EDAD


| Grupo de edad | Casos | % |
|-----------------------------|-------|---------|
| Niños (0-11 años) | 2 | 0.21% |
| Adolescentes (12 - 17 años) | 3 | 0.37% |
| Jovenes (18 - 29 años) | 13 | 2.34% |
| Adultos (30 - 59 años) | 241 | 26.61% |
| Adultos mayores (60 a +) | 622 | 70.47% |
| Total general | 881 | 100.00% |

El grupo de Adultos mayores es el más afectado en defunciones, acumula el mayor porcentaje de muertes por COVID19 (71%)

Fallecidos por sexo




Casos fallecidos por semana epidemiológica




| Según grupo de edad | Casos | % | T.I.A x 100, 000 hab. |
|-----------------------------|-------|---------|-----------------------|
| Niños (0-11 años) | 1540 | 6.30% | 2970.51 |
| Adolescentes (12 - 17 años) | 1123 | 4.59% | 4571.17 |
| Jovenes (18 - 29 años) | 6093 | 24.92% | 13085.22 |
| Adultos (30 - 59 años) | 12237 | 50.04% | 11800.39 |
| Adultos mayores (60 a +) | 3459 | 14.15% | 11627.28 |
| Total general | 24452 | 100.00% | |

Según etapa de vida los más afectados resultan ser los adultos en un 50 % y según sexo las mujeres en un 52 %; el mayor porcentaje de defunciones se presenta en hombres en un 64 %.

Confirmados y defunciones por grupo de edad






El mapa de densidad de casos confirmados de COVID-19, muestra de lo que va del año a nivel distrital en la Región Tumbes, que el distrito Tumbes (15961/24452), es el que presenta mayor concentración de casos de pacientes con COVID19, seguido de, los distritos de: Zarumilla (1970/24452), Corrales (1963/24452), Aguas Verdes (1098/24452), Zorritos (793/24452), La Cruz (780/24452), Papayal (581/24452), San Jacinto (389/24452), Pampas de Hospital (372/24452), Canoas de Punta Sal (211/24452), San Juan (206/24452), Matapalo (101/24452) y Casitas (27/24452).



% Características clínicas de casos confirmados




Densidad de casos confirmados de COVID19 de las 03 últimas semanas epidemiológicas



En las dos antepenúltimas semanas, la totalidad de distritos han reportado casos de COVID 19, y en esta última semana los distritos de Canoas de Punta Sal, Casitas, Pampas de Hospital y Matapalo no reportan casos; los distritos con una mayor concentración de casos en esta semana son Tumbes y Corrales.

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) - Región Tumbes SE09 - 2021

Tasas de incidencia acumulada distrital de EDAs Población General - Región Tumbes 2021 (SE01-09)



En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional a la SE 09; 207 casos de EDAS. La tasa de incidencia regional en menores de cinco años es de 9.43 casos por cada 1000 menores de cinco años. Mientras que la SE 09/*2020 (359 casos) en <05 años de edad. Significativamente mayor al número de casos que hasta la actualidad se han registrado.

El análisis del canal endémico EDAS en Población General, muestra que, en el acumulado a la SE09/2021 del presente año, estamos en zona de EXITO.

Tasa de Incidencia x 1000 hab. de las EDAS en Menores de 5 años SE01-09/ 2021 - Región Tumbes

| DISTRITO | T.I | CASOS | POBLACION |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| LA CRUZ | 27.68 | 23 | 831 |
| PAPAYAL | 24.39 | 16 | 656 |
| SAN JACINTO | 23.02 | 16 | 695 |
| ZORRITOS | 21.24 | 24 | 1130 |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 20.35 | 14 | 688 |
| AGUAS VERDES | 19.72 | 43 | 2181 |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 15.63 | 6 | 384 |
| ZARUMILLA | 9.69 | 20 | 2065 |
| CASITAS | 6.62 | 4 | 151 |
| CANOAS DE PUNTA SAL | 6.24 | 4 | 641 |
| TUMBES | 3.34 | 33 | 9877 |
| CORRALES | 3.13 | 7 | 2240 |
| MATAPALO | 0.00 | 0 | 411 |
| REGIONAL | 9.43 | 207 | 21950 |

Tasa de Incidencia x 1000 hab. de las EDAS en Población General SE01-09/ 2021 - Región Tumbes

| DISTRITO | T.I | CASOS | POBLACION |
|-----------------------|------|-------|-----------|
| San Jacinto | 6.05 | 57 | 9,421 |
| Casitas | 5.56 | 13 | 2,339 |
| La Cruz | 5.16 | 51 | 9,889 |
| Pampas de Hospital | 4.71 | 37 | 7,851 |
| Papayal | 4.22 | 25 | 5,930 |
| Zorritos | 2.70 | 36 | 13,317 |
| Zarumilla | 2.69 | 64 | 23,772 |
| Aguas Verdes | 2.37 | 58 | 24,519 |
| San Juan de la Virgen | 1.98 | 9 | 4,547 |
| Canoas Punta Sal | 1.00 | 6 | 6,028 |
| Corrales | 0.93 | 24 | 25,907 |
| Tumbes | 0.70 | 84 | 120,092 |
| Matapalo | 0.00 | 0 | 2,811 |
| REGIONAL | 1.81 | 464 | 256423 |

La TI a nivel regional es de 1.81 por mil hab. Los distritos que han presentado mayor incidencia son: San Jacinto con 6.05 por mil hab.; Casitas con 5.56 por mil hab.; La Cruz con el 5.16 por mil hab. Una de las determinantes sociales que se asocia al problema de las EDAS <05 años son las condiciones de salubridad y las prácticas de alimentación que siguen las madres. Recordemos que el lavado de manos reduce las EDAS en más del 65%, es importante fortalecer la educación sanitaria para mejorar las prácticas saludables de la población.

Cabe resaltar que es importante establecer un trabajo articulado con las autoridades locales para intervenir de manera integral resolviendo determinantes sociales de la salud de importancia como lo es el saneamiento básico, asegurando la disponibilidad y continuidad del servicio de agua en los sectores que más incidencia vienen presentando.

La distribución de los casos de EDAS en población general según mapa de riesgo acumulado a la SE 09/2021 son 464 casos, muestra un incremento de los casos de EDAS en menores de 05 años. Los factores determinantes de este indicador es la limitada disposición de agua en los domicilios considerando que solo se dispone de 4.5 horas por días de este servicio vital. Aunado a las malas prácticas de higiene.


Comportamiento de EDAS según semanas epidemiológicas 2021(01-09) - Región Tumbes

| EDAS POR GRUPO ETAREO | N°CASOS/SEMANA | | | | | | | | | TOTAL |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Menor de 1 año | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 48 |
| De 1 a 4 años | 23 | 15 | 27 | 11 | 17 | 24 | 10 | 11 | 21 | 159 |
| Mayores de 5 años | 48 | 42 | 20 | 27 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 257 |
| TOTAL | 79 | 60 | 55 | 43 | 47 | 56 | 38 | 38 | 48 | 464 |


La distribución de los casos de EDAS en Población General (464 casos) presenta una incidencia de 1 a 4 años de 34.27% y en menores de 1 año un 10.34%. Mayores de 05 años corresponde el 55.39% del total de casos de la población general.

Es imprescindible orientar medidas estratégicas orientadas a las determinantes sociales que agravan las condiciones de salubridad y cambio de conducta en la higiene de lavado de manos o manipulación de alimentos.

Mapa de Riesgo de EDAS en Población General según 03 últimas semanas epidemiológicas 2021(06-08) - Región Tumbes



Comportamiento de las EDAS en Población General SE01-09/ 2021 Canal Endémico Región Tumbes



De acuerdo al canal endémico de EDAS, aún nos encontramos en zona de EXITO a la SE09/2021, significa es necesario adoptar desde ya, las medidas de intervención para reducir el problema antes que se muestre de manera urgente el despliegue de acciones costosas efectivas para reducir el riesgo de muerte o complicaciones en el < 05 años.

Otros Daños de Notificación - Región Tumbes SE 09- 2021

MORTALIDAD MATERNA

Durante el año 2020 se han notificado **04 muertes maternas directas** (29 años de edad, procedente del AA.HH Alberto Fujimori – Aguas Verdes; 39 años de edad, procedente de Higuerón – San Jacinto; 31 años de edad procedente de la localidad de Corrales y 39 años de edad, procedente de Malval Alto - Corrales) y **02 muertes maternas indirectas** (39 años de edad, procedente Puerto Pizarro y 19 años de edad, procedente del AA.HH Alberto

TENIASIS Y EPILEPSIAS POR CISTICERCOSIS

A la SE 09/2021 no se ha confirmado casos. En el acumulado a la SE 52 no se han notificados casos. En el 2019 no se reportaron casos sospechosos de Teniasis. En el año 2019 se registran 09 casos de Epilepsia.

MORTALIDAD PERINATAL

A la SE 09/2021 no se han registrado muertes perinatales. Hasta la SE 53/2020 se han notificados 32 muertes perinatales de las cuales 19 son fetales y 13 neonatales.


| Año | FECHA_MTE | Según tipo | | Total |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Fetal | Neonatal | |
| 2020 | 1/01/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 22/01/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 24/01/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 17/03/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 23/03/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 25/03/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 5/02/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 26/02/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 1/03/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 2/03/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 11/03/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 18/03/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 8/04/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 21/04/2020 | 2 | 2 | 4 |
| | 8/05/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 12/05/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 14/05/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 19/05/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 11/06/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 28/06/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 23/07/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 25/07/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 1/08/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 30/08/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 2/09/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 27/09/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 3/10/2020 | 1 | 1 | 2 |
| | 12/10/2020 | 1 | 1 | 2 |
| 21/10/2020 | 1 | 1 | 2 | |
| 31/10/2020 | 1 | 1 | 2 | |
| Total 2020 | | 19 | 13 | 32 |

TUBERCULOSIS

A la SE 09/2021 se han notificado 04 casos y el 100% son casos nuevos todos adultos. De los cuales 01 tiene confección TB/DM. Se reporta 01 fallecido por TBC.

Hasta la SE 53/2020 se han notificado 60 casos. De los cuales 02 decesos por infección VIH-SIDA. En esta información se incluye al INPE 15 casos y ESSALUD 6 casos.

El 50% de los decesos corresponden entre 750 a 999 gr de peso al nacimiento, entre 26 y 29 semanas de Gestación. Implicando muertes fetales



ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS

A la SE 09_2021 se han confirmado 02 casos de ofidismo procedente de nuevo progreso, adolescente de 14 años de edad y pampa grande, adulto de 34 años de edad. Hasta la SE53/2020 se reportó 05 Casos de ofidismo procedente de Tumbes adulto de 59 años de edad, 01 Caso del distrito de Aguas Verdes, adulto de 38 años, 02 caso del distrito de Matapalo, adultos de 31 y 35 años y 01 caso del distrito de Pampas de Hospital, adulto de 32 años.

ZOONOSIS

Hasta la SE52-2019 del presente año no se ha reportado ningún caso de rabia canina en Tumbes. En el año 2021 (acumulado a la SE 09), no se han notificado casos de rabia canina.

SIFILIS EN GESTANTES Y CONGENITA

A la SE 09/2021 no se ha presentado casos. En el acumulado a la SE53 del 2020 se han confirmado 13 casos de sífilis materna y 07 casos de sífilis congénita. Haciendo un total de 20 casos de sífilis notificados en la Región Tumbes.

INMUNOPREVENIBLES

A la SE 09/2021, no se han notificado casos de varicela. De igual forma hasta la SE53 del 2020 no se ha reportado ningún caso de varicela con complicaciones.

SINDROME DE GUILLAIN BARRE

A la SE 09 del presente año no se ha confirmado casos. Hasta la SE 53 del 2020 se ha confirmado 01 caso, en el distrito de Tumbes, en niño de 07 años de edad, el mismo que se hospitalizo en el Hospital Regional de Tumbes.

Hasta la SE52 del 2019 se han reportado 06 casos de parotiditis sin complicaciones en personal de servicio militar, los cuales fueron hospitalizados para evitar la propagación de la enfermedad.

En el 2019 no se han reportado casos de sarampión ni rubeola. La migración venezolana de paso por la región Tumbes ha puesto en alerta a los establecimientos de salud.

Se continúan fortaleciendo las acciones de vigilancia y vacunación.

TETANOS

A la SE09 del 2021 no se han reportado casos de Tétanos. En el acumulado de las SE01-53 del año 2020 (01 fallecido), en un adulto de 46 años de edad, procedente del distrito de Aguas Verdes.