PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección Regional de Salud Tumbes


GOBIERNO REGIONAL TUMBES



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL 2026

CONTENIDO

- Dengue
- Malaria
- Zika
- Chikungunya
- Leptospirosis
- EDAS
- IRAS
- Neumonías
- Muerte Materna y Perinatal
- Infecciones Intrahospitalarias
- Otros daños sujetos a vigilancia epidemiológica



Semana Epidemiológica N° 41

DIRECCION EJECUTIVA EPIDEMIOLOGIA

(Del 11 al 17 de octubre del 2026)

DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA

PRESENTACIÓN

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 41-2026.

La información del presente Boletín Epidemiológico procede de la notificación de 47 establecimientos de salud de la Red Regional de Epidemiología.

La Red Regional está conformada por establecimientos de la Dirección Regional de Salud Tumbes, EsSalud y otros del sector salud de la región Tumbes.

La información es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Regional de Epidemiología de Tumbes, cuya fuente es el registro semanal de enfermedades y eventos sujetos a notificación inmediata o semanal. La Semana Epidemiológica inicia el domingo de cada semana y concluye el día sábado siguiente.

VERSIÓN ELECTRÓNICA

El boletín es un producto de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Tumbes. Se autoriza el uso total o parcial siempre y cuando se expresen las fuentes de información de este producto.

www.epi.diresatumbes.gob.pe

epitumbes@dge.gob.pe

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE SALUD TUMBES

Mg. Jennsy del Rosario Gallo Salgado

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

- Mg. Percy Mc Quen Vílchez Barreto
  Director Ejecutivo
- Dr. Wilmer Jhon Davis Carrillo
  Director de Inteligencia Sanitaria en Salud Pública
- Mg. Rommell Veintimilla González Seminario
  Director de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública
- Dra. María Edith Solís Castro
  Director de Brotes y EVISAP
- Mg. Luis Constantino Arévalo Guerrero
  Equipo Técnico
- Md. Christian Marzzio González Chicoma
  Equipo Técnico
- Bach. Ronald Edward Hernández Vargas
  Equipo Técnico
- Lic. Estefani Yudith Espinoza Risco
  Equipo Técnico
- Lic. Judith Sofia Zarate Mogollón
  Equipo Técnico
- Obst. Vicente Andres Córdova Zarate
  Equipo Técnico
- Lic. Esmeralda Berline Herrera Silva
  Equipo Técnico
- Lic. Carlos Jonathan Palacios Olaya
  Equipo Técnico
- Téc. Contab. César Augusto Palacios Chalen
  Digitador
- Lic. Adm. Tatiana Lisseth Vásquez Jiménez
  Asistente Administrativo


REDACCION Y EDICIÓN
- Obst. Vicente Andres Córdova Zarate
- Bach. Ronald Edward Hernández Vargas

PROCESO DE INFORMACIÓN
- Bach. Ronald Edward Hernández Vargas

DISEÑO
- Bach. Ronald Edward Hernández Vargas
- Ing. Jhon Cristhian Carbajal Crisanto

Alerta Epidemiológica por Sarampión

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-PERÚ) ha emitido la Alerta Epidemiológica N° 009-2026, **"ANTE LA TRANSMISIÓN COMUNITARIA DE SARAMPIÓN Y LA NECESIDAD DE FORTALECER LA RESPUESTA SEGÚN ESCENARIOS EPIDEMIOLÓGICOS EN EL PERÚ";** con el objetivo de alertar a los establecimientos de salud públicos (EESS), privados y mixtos a nivel nacional, a fin de intensificar la vacunación, la vigilancia e investigación epidemiológica y fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud, mediante acciones diferenciadas según el escenario epidemiológico de cada distrito. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informacion-publica/alertas-epidemiologicas/



Dengue - Región Tumbes SE 41-2026

En lo que va del año 2026 la región de Tumbes ha notificado 2394 casos de dengue, de los cuales el 52,10% son confirmados y el 47,90% se encuentran en calidad de probables; según cuadro clínico el 91,27% corresponde a dengue sin signos de alarma, el 8,48% corresponden a casos de dengue con signos de alarma y el 0,25% son dengue grave.

La tasa de incidencia acumulada (TIA) de 713,85 x 100 mil habitantes. El 100,00% (13/13) de los distritos reportan casos de dengue, siendo los distritos de Tumbes (44,24%), Corrales (12,36%) y Zorritos (9,52%) los que presentan el mayor número de casos (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución según forma clínica y SE de inicio de enfermedad reportados hasta SE41-2026

Distritos	Casos acumulados a la SE actual	%	TIA x 100mil Hab.	Casos SE 41 2026	Forma clínica						Tipo de diagnóstico				Fallecidos	Letalidad
					Dengue sin señales de alarma		Dengue con señales de alarma		Dengue grave		Confirmados		Probables			
					N.°	%	N.°	%	N.°	%	N.°	%	N.°	%		
Tumbes	1059	44.24	857.91	54	932	88.01	123	11.61	4	0.38	557	52.60	502	47.4	0	0
Corrales	296	12.36	923.04	2	272	91.89	23	7.77	1	0.34	144	48.60	152	51.4	0	0
Zorritos	228	9.52	1049.29	4	220	96.49	8	3.51	0	0.00	123	53.90	105	46.1	0	0
Aguas Verdes	210	8.77	600.07	10	206	98.10	4	1.90	0	0.00	111	52.90	99	47.1	0	0
Zarumilla	158	6.60	361.66	11	150	94.94	8	5.06	0	0.00	119	75.30	39	24.7	0	0
Papayal	152	6.35	1196.1	1	151	99.34	1	0.66	0	0.00	55	36.20	97	63.8	0	0
San Jacinto	122	5.10	1119.88	2	111	90.98	11	9.02	0	0.00	41	33.60	81	66.4	0	0
Pampas De Hospital	78	3.26	831.82	2	72	92.31	5	6.41	1	1.28	54	69.20	24	30.8	0	0
La Cruz	49	2.05	363.1	3	38	77.55	11	22.45	0	0.00	21	42.90	28	57.1	0	0
San Juan De La Virgen	24	1.00	348.13	0	19	79.17	5	20.83	0	0.00	12	50.00	12	50.0	0	0
Matapalo	9	0.38	111.1	0	5	55.56	4	44.44	0	0.00	3	33.30	6	66.7	0	0
Canoas De Punta Sal	5	0.21	45.52	0	5	100.00	0	0.00	0	0.00	3	60.00	2	40.00	0	0
Casitas	4	0.17	57.22	0	4	100.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
Total	**2394**	**100**	**713.85**	**89**	**2185**	**91.27**	**203**	**8.48**	**6**	**0.25**	**1247**	**52.1**	**1147**	**47.9**	**0**	**0**

(*) Hasta la SE 41/2026

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

En comparación a lo reportado en la misma SE 41 del año 2025 con 1021 casos, se evidencia en el presente 2026 un aumento de 134,48% respecto al año anterior. La TIA en el 2025 a la SE 41 se encontraba en 379,50 casos por 100 mil habitantes, menor a lo reportado en el presente año. En el presente año no se han notificado defunciones por dengue (Tabla 2).

Tabla 2. Número de casos, incidencia y defunciones de dengue, Región Tumbes, periodo 2022*-2026*

Indicador	Años				
	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos*	704	12151	5176	1021	2394
Diferencia respecto al año anterior (%)	0.00	1625.99	-57.40	-80.27	134.48
Incidencia por 100 mil hab.	271.23	4617.99	1947.01	379.50	713.85
Defunciones	0	9	1	1	0

(*) Hasta la SE 41/2026

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Según curso de vida los casos se distribuyen en todas las edades, con mayor frecuencia en niños y adultos. Sin embargo, el mayor riesgo de enfermar se observa en los niños y adolescentes con una TIA de 1173,20 x 100 mil hab. y 1100,46 x 100 mil hab. respectivamente (Tabla 3).


Tabla 3. Tasa de incidencia acumulada, según Curso de Vida, Tumbes 2026 (SE 01-41)

Curso de vida	Casos	%	T.I.Ax100 mil hab.
Niño [0-11]	696	29.07%	1173.20
Adolescente [12-17]	373	15.58%	1100.46
Joven [18-29]	460	19.21%	737.32
Adulto [30-59]	661	27.61%	488.99
Adulto mayor [60+]	204	8.52%	457.61
Total	**2394**	**100.00%**	**713.85**

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

En la presente SE del 2026 la Región Tumbes se encuentra en zona de **EPIDEMIA** para dengue, lo que indica un aumento en la transmisión de la enfermedad, en las últimas semanas del presente año muestra un incremento de casos (Grafico 1).

Gráfico 1. Comportamiento de dengue, Región Tumbes, 2026 (SE 01-41) canal endémico




Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Dengue vs variables climáticas SE 01-41/2026

Octubre 2026 - Diciembre 2026

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, pone a disposición el pronóstico trimestral de lluvias y temperaturas extremas para los tomadores de decisiones de los sectores sensibles al clima como la agricultura, la salud, los recursos hídricos y la gestión de riesgos de desastres. Los pronósticos trimestrales están enmarcados en la escala estacional y obedecen a las condiciones esperadas de la temperatura superficial del mar, así como los factores atmosféricos asociados a la variabilidad del clima que posteriormente son analizados bajo un enfoque de Consenso.

Gráfico 2. Pronóstico climático de precipitaciones y casos de dengue, Región de Tumbes, SE 01-41/2026



Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=pronostico-climatico


NORMAL-SUPERIOR

Cuando las probabilidades de ocurrencia de precipitaciones y presencia de casos de dengue son superiores a las normales, según periodo estacional.

SUPERIOR


Cuando las probabilidades de que las temperaturas máximas sean superiores a lo esperado y aumenten la ocurrencia de casos de dengue.

Gráfico 3. Pronóstico climático de temperatura máxima y casos de dengue, Región de Tumbes, SE 01-41/2026



Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=pronostico-climatico

Gráfico 4. Pronóstico climático de temperatura mínima y casos de dengue, Región de Tumbes, SE 01-41/2026



Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=pronostico-climatico

SUPERIOR

Cuando el escenario más probable de que las temperaturas mínimas sean superiores a las condiciones normales.

Chikungunya - Región Tumbes SE 41/2026

A la SE 41-2026 en la región de Tumbes no registran casos de Chikungunya. En el 2025 a la SE 53 Tumbes reportó 18 casos probables; distribuidos en los distritos de Tumbes (88,90%), La Cruz (5,55%) y Zorritos (5,55%), los cuales luego de realizarse las pruebas diagnósticas de laboratorio se descartaron.

En el 2024 se reportaron 38 casos de Chikungunya a nivel nacional, de los cuales Tumbes aporto el 84,21% (32 casos), seguido de Piura con el 15,79% (6 casos) (Tabla 4).

Tabla 4. Casos de Fiebre por virus Chikungunya y tasas de incidencia por departamento, Perú 2024-2026*

Departamentos	2024			2025			2026*		
	Casos	%	TIA 100 mil hab.	Casos	%	TIA 100 mil hab.	Casos	%	TIA 100 mil hab.
Loreto	0	0,00	0,00	1	100,00	0,09	0	0,00	0,00
San Martin	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	25,00	0,10
Huanuco	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	25,00	0,14
Madre de Dios	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	50,00	0,94
Piura	6	15,79	0,28	0	0,00	0,00	0	00,00	0,00
Tumbes	32	84,21	12,04	0	0,00	0,00	0	00,00	0,00
Perú	**38**	**100,00**	**0,11**	**1**	**100,00**	**0,00**	**4**	**100,00**	**0,01**

(*) Hasta la SE 41/2026
Casos = casos confirmados + casos probables
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

A la SE 41-2026 a nivel nacional se han registrado 04 casos de Chikungunya, procedentes de los departamentos de San Martin, Huánuco y Madre de Dios (Tabla 4); no se han reportado defunciones. La TIA en el presente 2026 se encuentra en 0,01 x 100 mil habitantes.

En el 2025, en el mismo periodo se notificó 01 caso probable, así mismo no se notificaron defunciones (Tabla 5).

Tabla 5. Casos de Fiebre por virus Chikungunya, tasas de incidencia y defunciones, Perú 2021*-2026*

Años	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	409	624	70	38	1	4
Incidencia por 100 mil hab.	1,24	1,88	0,21	0,11	0,00	0,01
Defunciones	0	0	0	0	0	0

(*) Hasta la SE 41/2026
Casos = casos confirmados + casos probables
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Leptospirosis - Región Tumbes SE 41-2026

A la SE 41-2026 se han registrado 995 casos de leptospirosis, de las cuales se han confirmado 358 casos (35,98%) y 637 casos (64,02%) se encuentra en calidad de probable. La TIA regional en el 2026 se encuentra en 296,69 casos x 100 mil habitantes. 04 distritos presentan una TIA por encima del valor regional: San Jacinto (596,66), Corrales (567,54%), Pampas de Hospital (447,90%) y Tumbes (411,54%) (Tabla 6).

Tabla 6. Tasa de incidencia y casos de Leptospirosis según distrito de infección, Región Tumbes, 2026

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIAx100mil hab.
	N.°	TIAx100mil hab.	N.°	TIAx100mil hab.		
Tumbes	204	165.26	304	246.27	508	411.54
Pampas de Hospital	7	74.65	35	373.25	42	447.90
San Jacinto	24	220.30	41	376.35	65	596.66
Corrales	60	187.10	122	380.44	182	567.54
La Cruz	8	59.28	21	155.61	29	214.89
Zarumilla	23	52.65	47	107.58	70	160.23
San Juan de la Virgen	5	72.53	11	159.56	16	232.09
Casitas	1	14.30	6	85.82	7	100.13
Zorritos	15	69.03	16	73.63	31	142.67
Canoas de Punta Sal	2	18.21	2	18.21	4	36.42
Papayal	2	15.74	8	62.95	10	78.69
Matapalo	2	24.69	2	24.69	4	49.38
Aguas Verdes	5	14.29	22	62.86	27	77.15
Departamento de Tumbes	358	106.75	637	189.94	995	296.69

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

En comparación a lo reportado en el mismo periodo del 2025 con 345 casos de Leptospirosis, se observa un aumento del 188,41%, evidenciándose una alta transmisión de la enfermedad. La TIA regional en el 2025 se situaba en 128,23 casos x 100 mil habitantes muy por debajo de la TIA actual.

En el presente año se han notificado 04 defunciones por leptospirosis las que corresponden a 2 mujeres de 11 y 65 años y un varón de 36 años ambos procedentes del distrito de Tumbes y un adolescente de 16 años procedente del distrito de Canoas de Punta Sal (Tabla 7).

Tabla 7. Casos, tasa de incidencia y defunciones por Leptospirosis, Región Tumbes, 2022-2026*

Indicadores	2022	2023	2024	2025	2026*
N° de Casos	413	578	349	368	995
Incidencia por 100 mil hab.	159,12	219,67	131,28	136,78	296,69
Defunciones**	0	0	0	0	4
N° de Casos hasta la SE 41	244	557	280	345	995
Diferencia respecto al año anterior (%) hasta la SE 41	130,19	128,28	-4973	23,21	188,41
Incidencia por 100 mil hab. hasta la SE 41	94,01	211,69	105,32	128,23	296,69
Defunciones** hasta la SE 41	0	0	0	0	4

(*) Hasta la SE 41/2026
(**) Solo se consideran fallecidos de casos confirmados
Casos = casos confirmados + casos probables
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Neumonías y SOB - Región Tumbes SE 41-2026

Hasta la SE 41 del presente año se han notificado a nivel regional 9469 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años; además se han notificado 102 casos de neumonías, de las cuales 20 por neumonía grave y 582 casos de SOB (Tabla 8).

Tabla 8. Casos de IRAS en < 05 años según tipo de diagnóstico, Región Tumbes (SE 01-41/2026)

Diagnostico	N° casos/semanas																																												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
IRA	192	153	156	164	157	143	146	172	244	262	314	323	289	293	273	288	250	277	267	312	216	237	240	258	240	195	236	306	229	205	193	207	198	195	267	252	220	252	233	212	203	9469
Neumonia	4	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	5	4	0	6	10	2	1	2	5	1	4	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1	1	1	0	1	6	1	2	1	1	82
Nuemonia grave	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	20
SOB	17	16	15	10	14	3	8	6	9	17	20	16	23	22	30	17	21	19	28	22	21	18	9	23	12	17	4	11	9	11	12	12	10	10	8	12	12	7	18	7	6	582
Total	213	171	172	175	173	147	155	179	256	282	337	344	317	315	310	316	274	297	297	340	238	260	251	281	253	215	240	321	240	216	206	220	209	206	276	265	239	260	255	221	211	10153


Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Tabla 9. Incidencia acumulada distrital de IRAS en < de 5 años, Región Tumbes, 2026 (SE01-41)

Distritos	T.I x 10mil hab.	Casos
San Jacinto	12924.84	791
San Juan de la Virgen	10293.26	351
Casitas	9612.40	124
Papayal	8985.51	558
Pampas de Hospital	8086.21	469
Zorritos	7546.43	772
La Cruz	7088.07	499
Canoas de Punta Sal	6850.15	448
Corrales	5616.15	1071
Aguas Verdes	5096.66	870
Tumbes	3460.73	2952
Matapalo	3042.51	136
Zarumilla	2185.90	428
Departamento Tumbes	**4928.43**	**9469**

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Gráfico 5. Mapa de riesgo de IRAS en < de 5 años según 03 últimas semanas epidemiológicas 39-41/2026




Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

La tasa de incidencia acumulada regional de IRAS en <05 años es de 4928,43 x 10 mil hab., 09 distritos presentan las incidencias por encima del valor regional: Casitas, Zorritos, Papayal, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen, La Cruz, San Jacinto, Canoas de Punta Sal y Corrales (Tabla 9).

En relación a las últimas 03 semanas el distrito de Casita presenta alto riesgo de transmisión de IRAS (Grafico 5).

Gráfico 6. Comportamiento de IRAS, Región Tumbes, 2026 (SE 01-41) canal endémico



Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

El canal endémico de IRAS muestra que hasta la SE 41-2026 se encuentran en zona de **ÉXITO** (Grafico 6).

COVID-19

Hasta la presente semana 41-2026 se han reportado 22 casos de COVID-19. La TIA regional del 2026 se encuentra en 6,60 x 100 mil hab. (Tabla 10). Desde el año 2023 los casos de COVID-19 se han reducido notablemente, reduciéndose a un promedio de dos casos por semana. El distrito de Tumbes presenta alto riesgo de transmisión.

La población y las autoridades deben mantenerse vigilantes ante brotes o conglomerados de casos y mantener las medias de autocuidado de la salud. No se reportan defunciones.


Tabla 10. TIA de casos confirmados de COVID-19 por distritos, Región Tumbes, 2020-2026*

Distrito de Residencia	Casos confirmados								%	Población 2026	TIA* 2026
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Nuevos Últ. S.E			
TUMBES	14,377	9,391	8,173	451	57	92	**15**	0	0.11%	123,440	12.2
ZARUMILLA	1,845	1,364	861	29	22	18	**2**	0	0.01%	43,687	4.6
CORRALES	1,765	1,796	1,520	29	1	5	**3**	0	0.02%	32,068	9.4
PAMPAS DE HOSPITAL	295	507	424	11	1	2	**0**	0	0.00%	9,377	0.0
ZORRITOS	725	671	742	36	7	6	**1**	0	0.01%	21,729	4.6
SAN JACINTO	317	316	344	8	0	1	**0**	0	0.00%	10,894	0.0
PAPAYAL	541	190	210	23	0	1	**0**	0	0.00%	12,708	0.0
LA CRUZ	732	524	605	12	1	0	**1**	0	0.01%	13,495	7.4
AGUAS VERDES	1,040	513	275	6	3	2	**0**	0	0.00%	34,996	0.0
MATAPALO	99	85	114	12	2	0	**0**	0	0.00%	8,101	0.0
SAN JUAN DE LA VIRGEN	173	328	421	7	1	1	**0**	0	0.00%	6,894	0.0
CASITAS	22	37	99	2	0	0	**0**	0	0.00%	6,991	0.0
CANOAS DE PUNTA SAL	153	167	210	5	1	0	**0**	0	0.00%	10,984	0.0
OTRAS REGIONES DE PERÚ	237	232	30	4	2	0	0	0	0.00%		
ECUADOR	8	0	0	0	0	0	**0**	0	0.00%		
Total	22,329	16,121	14,028	635	98	128	22	0	0.16%	335,364	6.6

(*) Hasta la SE 41/2026
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Según curso de vida los casos se distribuyen en todas las edades. Sin embargo, el mayor riesgo de enfermar se observa en los adultos y adultos mayores con una TIA de 12,97 x 100 mil hab. y 8,29 x 100 mil hab. respectivamente (Grafico 7).

Gráfico 7. Tasa de incidencia acumulada x c/100,000 hab., por curso de vida, Región Tumbes, 2026



Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) - Región Tumbes SE 41 - 2026

Hasta la SE 41-2026 se han notificado 2241 casos de EDAS en menores de 05 años y 7177 casos en mayores de 05 años, los que sumados hacen un total de 9418 casos de EDAS en población general en la región Tumbes (Tabla 11,12).


La tasa de incidencia regional en < de 05 años es de 1166,40 casos x 10 mil < de 05 años (Tabla 11); mientras que en las últimas 3 semanas epidemiológicas los distritos de Casitas y San Jacinto presentan alto riesgo de transmisión de EDAS (Grafico 8).

Tabla 11. Tasa de incidencia x 10 mil hab. de las EDAS en < de 05 años, Tumbes, 2026 (SE01-41)

Distritos	Casos	Población	T.I x 10mil hab.
Casitas	39	129	3023.26
Canoas de Punta Sal	148	654	2263.00
San Jacinto	128	612	2091.50
Zorritos	173	1023	1691.10
Papayal	101	621	1626.41
Pampas de Hospital	86	580	1482.76
Aguas Verdes	244	1707	1429.41
San Juan de la Virgen	41	341	1202.35
Corrales	223	1907	1169.38
La Cruz	77	704	1093.75
Matapalo	44	447	984.34
Zarumilla	187	1958	955.06
Tumbes	750	8530	879.25
Departamento Tumbes	2241	19213	1166.40

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Gráfico 8. Mapa de riesgo de EDAS en < de 05 años, según 03 últimas semanas epidemiológicas, Tumbes, (39-41/2026)



Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*


La tasa de incidencia regional en población general es de 280,83 casos x 10 mil hab. (Tabla 12); mientras que en las últimas 3 semanas epidemiológicas el distrito de San Jacinto presenta alto riesgo de transmisión de EDAS (Grafico 9).

Tabla 12. Tasa de incidencia x 10 mil hab. de las EDAS en población general, Región Tumbes, 2026 (SE01-41)

Distritos	Casos	Población	T.I x 10mil hab.
San Jacinto	627	10,894	575.55
Zorritos	937	21,729	431.22
Pampas de Hospital	387	9,377	412.71
Canoas Punta Sal	421	10,984	383.28
Papayal	405	12,708	318.70
La Cruz	404	13,495	299.37
Corrales	907	32,068	282.84
Tumbes	3134	123,440	253.89
Aguas Verdes	847	34,996	242.03
Casitas	152	6,991	217.42
Zarumilla	948	43,687	217.00
San Juan de la Virgen	133	6,894	192.92
Matapalo	116	8,101	143.19
Departamento Tumbes	9418	335364	280.83


Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Gráfico 9. Mapa de riesgo de EDAS en población general según 03 últimas semanas epidemiológicas, Tumbes, (39-41/2026)



Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Gráfico 10. Comportamiento de las EDAS en población general, Tumbes, 2026 (SE01-41) Canal Endémico



Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Según el canal endémico de EDAS en la presente semana nos encontramos en zona de **EPIDEMIA** (Grafico 10).

Otros Daños de Notificación - Región Tumbes SE 41-2026


MORTALIDAD MATERNA

Hasta la SE 41-2026 se han registrado 02 muertes maternas directas de 37 y 38 años procedentes del distrito de Corrales y Tumbes respectivamente. En el año 2025 se reportó 01 muerte materna directa, precedente del distrito de Corrales.

La razón de mortalidad materna (RMM) es un indicador que permite medir el impacto de las políticas de salud, Así como la calidad y equidad en las prestaciones de servicios en salud materna. En los últimos 10 años y lo que va del presente año 2026 la RMM en la región de Tumbes se encuentra en 58,32 x 100 mil nacidos vivos; lo que quiere decir que, por cada 100 mil nacidos vivos, 58 mujeres pierden la vida por complicaciones del embarazo, parto o puerperio.

La tasa de mortalidad materna (TMM) en Tumbes se encuentra 3,60 x 100 mil mujeres en edad fértil; lo que quiere decir que, por cada 100 mil mujeres en edad fértil, 3 de ellas tiene riesgo de morir por complicaciones del embarazo, parto y puerperio (Grafico 11).

Gráfico 11. Comportamiento de las muertes maternas, según año y razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad, Región Tumbes, 2016-2026*




(*) Hasta la SE 41/2026
Se consideraron las muertes maternas directas e indirectas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.
No se incluye muertes maternas tardías.
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

En el presente grafico se observa que las causas más frecuentes a lo largo del periodo en evaluación son las causas indirectas, seguida de los trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio y las hemorragias obstétricas.

Es importante destacar que el año con mayor diversidad de causas de defunción es el 2020, en el 2021 al igual que el año anterior las causas de defunción fueron diversas, destacando las muertes maternas asociadas a infección por COVID-19 (40,00%) (Grafico 12).

Gráfico 12. Proporción de muertes maternas según causa de defunción, Tumbes, 2016-2026*




(*) Hasta la SE 41/2026
Se consideraron las muertes maternas directas e indirectas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.
No se incluye muertes maternas tardías.
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL

Hasta la presente SE 41-2026 se han notificado 31 muertes fetales y neonatales, de las cuales de las cuales 17 corresponde a muertes fetales y 14 muertes neonatales. En el 2025 se notificaron 38 casos de muertes fetales y neonatales, de las cuales 21 corresponde a muertes fetales y 17 muerte neonatal. En el 2024 se notificaron 40 muertes perinatales, de las que 21 corresponden a muertes fetales y 19 a muertes neonatales (Grafico 13).

Gráfico 13. Comportamiento de las Muertes fetales y neonatales años 2010–2026*



(*) Hasta la SE 41/2026
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

En relación a las muertes neonatales el 64,28% se dieron en el tercer trimestre de la gestación (09 casos), con pesos que oscilaban desde los 1000-1499gr. (bajo peso al nacer) a 2500-3999gr. (peso adecuado) (Tabla 13).

Tabla 13. muertes neonatales, según edad gestacional y peso al nacimiento, Región Tumbes, 2026

Edad Gestacional (semanas)	Peso al nacimiento (gr)					Total
	Extremadamente bajo peso al nacer (500-900gr.)	Muy bajo peso al nacer (1000-1499gr.)	bajo peso al nacer (1500-2499gr.)	peso adecuado (2500-3999gr.)	Macrosomico (4000gr. a más)	
23	1					1
24	1					1
26		1				1
27		2				2
31		1				1
33				1		1
34				2		2
37			1	2		3
38			1			1
39				1		1
Total	2	4	2	6	0	14


Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

VIRUELA DEL MONO (VIRUELA SÍMICA)

A la SE 41/2026 No se han reportado casos.

En el año 2024 se notificaron 6 casos sospechosos de Viruela del Mono en Tumbes, los cuales fueron descartados mediante PCR. En el año 2022 se confirmó 01 caso (varón de 29 años de edad).

Gráfico 14. Comportamiento de la Viruela del Mono, Región Tumbes, periodo 2020–2026*




(*) Hasta la SE 41/2026
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

MALARIA

Hasta la SE 41-2026 no se reportan casos. En el 2025 se notificaron 04 casos de malaria vivax de las cuales 02 corresponden a casos importados y 02 caso autóctonos.

Gráfico 15. Comportamiento de la Malaria, Región Tumbes, periodo 2000–2026*



(*) Hasta la SE 41/2026
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Accidentes por Animales Ponzoñosos - Región Tumbes SE 41-2026

OFIDISMO


Tabla 14. Casos de ofidismo según distrito, Región Tumbes, 2024-2026*

Distrito	2024	2025	2026*
Matapalo	5	8	0
Zarumilla	0	3	4
Aguas Verdes	2	2	1
Papayal	0	0	3
Canoas De Punta Sal	1	0	1
Tumbes	0	1	1
San Jacinto	0	2	0
San Juan De La Virgen	0	0	1
Total	8	16	11

(*) Hasta la SE 41/2026

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Gráfico 16. Comportamiento de ofidismo, Región Tumbes, periodo 2000–2026*



(*) Hasta la SE 41/2026

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Hasta la SE 41-2026 se ha reportado 11 casos de ofidismo procedentes de los distritos de San Juan de la Virgen, Zarumilla, Aguas Verdes, Tumbes, Canoas de Punta Sal y Papayal. En el año 2025 se confirmaron 16 casos de ofidismo de los cuales el 50,00% proceden del distrito de Matapalo, seguidos de los distritos de Zarumilla (18,75%), San Jacinto (12,50%), Aguas Verdes (12,50%) y Tumbes (6,25%) (Tabla14).

En el 2024 se confirmaron 08 casos de ofidismo procedente de Punta Sal-Cancas, Quebrada Seca y nuevo progreso-Matapalo y Aguas Verdes (Grafico 16).

LOXOCELISMO


Tabla 15. Casos de loxoscelismo según distrito, Región Tumbes, 2024-2026*

Distrito	2024	2025	2026
Papayal	1	-	-
Tumbes	1	-	-
Matapalo	-	1	1
Zarumilla	-	2	4
Total	2	3	5

(*) Hasta la SE 41/2026

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Gráfico 17. Comportamiento de loxoscelismo, Región Tumbes, periodo 2006–2026*



(*) Hasta la SE 41/2026

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Hasta la SE 41-2026 se ha reportado 05 casos de loxoscelismo procedentes de los distritos de Zarumilla, Papayal, Matapalo y Tumbes. En el año 2025 se confirmaron 03 casos de loxoscelismo procedentes de los distritos de Zarumilla y Matapalo (Tabla15). El comportamiento de los casos de loxoscelismo desde el año 2016 han ido disminuyendo, es así que en los últimos 10 años los casos oscilan entre 1 a 2 eventos por año. En el 2024 se confirmaron 02 casos de loxoscelismo (Grafico 17).

TUBERCULOSIS (TBC)

En la presente semana 41-2026 se han notificado 60 casos de tuberculosis, de los cuales el 88,30% corresponden a casos nuevos, siendo el sexo masculino los más afectados con el 70,00%, según curso de vida los adultos son el grupo más afectado con el 43,30% de los casos; de los cuales el 83,30% se localizan a nivel pulmonar.

Además, el 23,30% (14 casos) tienen la condición de diabetes y el 11,70% (07 casos) presentan coinfección con VIH-Positivos. No se reportan gestantes con tuberculosis, hasta la presente SE 41 se ha reportado 02 muerte asociada a tuberculosis.

Hasta la SE 53-2025 se notificaron 208 casos de tuberculosis, de los cuales el 83,20% correspondían a casos nuevos, siendo el sexo masculino los más afectados con el 70,70%, según curso de vida los adultos son el grupo más afectado con el 50,50% de los casos; de los cuales el 88,00% se localizan a nivel pulmonar.

Además, se reportó 01 gestante con tuberculosis y 05 muertes asociadas a tuberculosis (Tabla 16).

Tabla 16. Caracterización de los casos de tuberculosis, Región Tumbes, 2025-2026*

Características		2025		2026*	
		Frecuencia	%	Frecuencia	%
Sexo	Masculino	147	70.7	42	70
	Femenino	61	29.3	18	30
Curso de vida	Niño (0-11 años)	3	1.4	0	0
	Adolescente (12-17 años)	9	4.3	1	1.7
	Joven (18-29 años)	43	20.7	13	21.7
	Adulto (30-59 años)	105	50.5	26	43.3
	Adulto Mayor (60 años a mas)	48	23.1	19	31.7
Localización	Extrapulmonar	25	12	10	16.7
	Pulmonar	183	88	50	83.3
Ingreso	Antes tratado	35	16.8	7	11.7
	Nuevo	173	83.2	53	88.3
Coinfección	VIH positivo	17	8.2	7	11.7
	Diabetes	33	15.9	14	23.3
Gestante	SI	1	0.5	0	0
Muerte	Asociada a TB	5	2.4	2	3.3
Total de casos		208		60	

(*) Hasta la SE 41/2026

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Enfermedades no Transmisibles - Región Tumbes SE 41-2026


DIABETES MELLITUS

Tabla 17. Casos notificados de diabetes según medida de frecuencia y tipo, Región Tumbes, 2020-2026*

Años	Incidentes			Prevalentes		Total
	Diabetes tipo I	Diabetes tipo II	Diabetes gestacional	Diabetes tipo I	Diabetes tipo II	
2020	0	11	0	0	36	47
2021	0	8	0	0	72	80
2022	1	245	2	3	386	637
2023	2	143	1	2	451	599
2024	0	37	1	0	302	340
2025	1	27	0	3	1252	1283
2026*	1	14	1	1	282	299
Total	4	485	5	9	2781	3285

(*) Hasta la SE 41/2026
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Gráfico 18. Distribución de casos según Sexo, Tumbes 2026



Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/ MINSA*

Hasta la presente SE 41-2026 se han notificado 299 casos de diabetes mellitus, de los cuales el 94,65% son casos prevalentes (antiguos) y el 5,35% corresponden a casos incidentes (nuevos); según tipo de diabetes el 99,33% de los casos son de tipo II (Tabla 17). En relación al sexo el 57,00% corresponden a mujeres (Grafico 18).

En relación al año 2025 hasta la SE 53 se notificaron 1283 casos de diabetes mellitus, de los cuales el 97,82% fueron casos prevalentes (antiguos) y el 2,18% correspondieron a casos incidentes (nuevos); el 99,69% de los casos de diabetes son de tipo II (Tabla 17).


CANCER

Tabla 18. Casos notificados de cáncer según distrito (registro hospitalario), Región Tumbes, 2025-2026*

Distritos	2025	2026*
	Casos	Casos
Tumbes	77	48
Zarumilla	15	9
Corrales	11	4
Pampas de Hospital	10	5
Aguas Verdes	9	5
La Cruz	6	2
San Jacinto	5	3
Zorritos	5	2
Canoas de Punta Sal	3	1
Papayal	2	4
San Juan de la Virgen	1	1
Departamento Tumbes	144	84

(*) Hasta la SE 41/2026
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Gráfico 19. Casos de cáncer por sexo según tipo de cáncer (registro hospitalario), Tumbes 2025-2026*



(*) Hasta la SE 41/2026
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Al tercer trimestre del 2026 el distrito de Tumbes concentra el 57,14% de los casos registrados de cáncer a nivel hospitalario (Tabla 18). En los últimos 2 años, el cáncer de cuello uterino es la neoplasia más importante que afecta a las mujeres con el 27,41%, seguido por el cáncer de mama con el 18,52% y en los varones las neoplasias más frecuentes es el cáncer de estómago con el 16,13% y el cáncer de próstata con el 12,90%, seguido del cáncer del sistema linfático con el 8,60% (Grafico 19).

Enfermedades inmunoprevenibles - Región Tumbes SE 41-2026

Tabla 19. Casos confirmados de enfermedades inmunoprevenibles, Región Tumbes, 2021-2026*

Años	Tos ferina	Varicela		Parotiditis
		Sin complicaciones	Con complicaciones	
2021	1	2		
2022		4		
2023		22		3
2024		96		4
2025	10	31		
2026*	4	66		2
Total	**15**	**221**	**0**	**9**

(*) Hasta la SE 41/2026
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

TOS FERINA
Hasta la presente SE 41-2026 se han notificado 04 casos confirmados de Tos ferina en la región de Tumbes. En relación a los últimos 6 años, el 2025 ha sido el año con el mayor número de casos confirmados (66,66%), siendo los menores de un año el grupo más vulnerable y que corren un alto riesgo de padecer formas graves de la enfermedad e incluso la muerte (Tabla 19).

VARICELA
Hasta la presente SE 41-2026 se han notificado 66 casos confirmados de Varicela sin complicaciones en la región de Tumbes. En relación a los últimos 6 años, se han reportado un total de 221 casos de Varicela sin complicaciones, siendo el 2024 el año con el mayor número de casos confirmados (43,44%) (Tabla 19).

PAROTIDITIS
Hasta la presente SE 41-2026 se han notificado 02 casos confirmados de Parotiditis en la región de Tumbes. En los últimos 6 años, se han reportado un total de 09 casos de Parotiditis, siendo el 2024 el año con el mayor número de casos confirmados (44,44%) (Tabla 19).

SARAMPIÓN
Hasta la presente SE 41-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.

DIFTERIA
Hasta la presente SE 41-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.

FIEBRE AMARILLA
Hasta la presente SE 41-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.

HEPATITIS B
Hasta la presente SE 41-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.

PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA
Hasta la presente SE 41-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) - Región Tumbes SE 41-2026

Tabla 20. Densidad de incidencia e incidencia acumulada de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), según factor de riesgo y servicio hospitalario, Hospital Regional II-2 JAMO - Tumbes, 2026

Tipo de IAAS	Factor de riesgo	Servicio hospitalario	N° de IAAS mensual								N° de días de exposición y procedimientos acumulados	Total, IAAS	Tasa acumulada	Tasa referencial de EESS II-2	Tasa nacional II-2
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Neumonía	Ventilación mecánica	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0.00	1,87	1,66
		UCI adulto	0	0	0	0	1	0	2	0	527	1	1.90	10,71	7,12
Infección del tracto urinario	Sonda Vesical	UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	934	0	0.00	2,04	1,98
		Medicina	0	0	0	0	0	0	0	0	971	0	0.00	1,48	1,93
		Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0	594	0	0,00	0,39	0,79
Infección del torrente sanguíneo	Catéter Venoso Central	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0,00	2,35	3,48
		UCI adulto	0	0	0	0	0	1	0		845	1	1.18	1,59	1,18
	Nutrición Parenteral Total	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0,00	0,00	0,00
	Catéter Hemodiálisis	UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0,00	0,00	0,00
	Catéter Venoso Periférico	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0.00	0,41	0,66
Infección de sitio quirúrgico	Colecistectomía	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0.00	0,16	0,13
	Hernia Inguinal	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0,00	0,31	0,62
	Prótesis de Cadera	Traumatología	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	1,03
	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	0	0	0	0	1	0	0	679	1	0.15	0,65	0,91
Endometritis	Parto Vaginal	Gineco-obstetricia	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	0,00	0,06	0,06
	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	1	0	0	1	1	0	0	679	3	0.44	0,13	0,10
Total			0	1	0	0	2	3	2	0		8			

(*) Hasta la SE 41/2026

Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

Hasta SE 41-2026 el Hospital Regional II-2 JAMO – Tumbes se han notificado 08 casos de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), distribuidas en el servicio de gineco-obstetricia y el servicio de UCI adulto.

La tasa acumulada de IAAS por neumonía asociado a ventilación mecánica en UCI adulto es de 1,90 casos por 1000 días de exposición, que es menor al valor nacional referencial.

La tasa acumulada de IAAS por infección del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central en UCI adulto es de 1,18 casos por 1000 días de exposición, que es igual al valor nacional referencial.

La tasa acumulada de IAAS en ginecobstetricia por infección de sitio quirúrgico asociado a parto por cesárea que es menor al valor nacional referencial (0,15 vs 0,91).

La tasa acumulada de IAAS en ginecobstetricia por endometritis asociada a parto por cesárea es mayor que el valor nacional referencial (0,44 vs 0,10).

Es necesario implementar medidas urgentes que permitan reducir estas incidencias, así como investigar la ocurrencia de brotes, los agentes involucrados y los factores condicionantes.

Tabla 21. Densidad de incidencia e incidencia acumulada de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), según factor de riesgo y servicio hospitalario, Hospital Carlos Alberto Cortez Jiménez Essalud - Tumbes, 2026

Tipo de IAAS	Factor de riesgo	Servicio hospitalario	N° de IAAS mensual								N° de días de exposición y procedimientos acumulados	Total, IAAS	Tasa acumulada	Tasa referencial de EESS II-2	Tasa nacional II-2
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Neumonía	Ventilación mecánica	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0.00	1,87	1,66
		UCI adulto	0	0	0	0	1	0	2	0	527	1	1.90	10,71	7,12
Infección del tracto urinario	Sonda Vesical	UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	934	0	0.00	2,04	1,98
		Medicina	0	0	0	0	0	0	0	0	971	0	0.00	1,48	1,93
		Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0	594	0	0,00	0,39	0,79
Infección del torrente sanguíneo	Catéter Venoso Central	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0,00	2,35	3,48
		UCI adulto	0	0	0	0	0	1	0		845	1	1.18	1,59	1,18
	Nutrición Parenteral Total	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0,00	0,00	0,00
	Catéter Hemodiálisis	UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0,00	0,00	0,00
	Catéter Venoso Periférico	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0.00	0,41	0,66
Infección de sitio quirúrgico	Colecistectomía	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0.00	0,16	0,13
	Hernia Inguinal	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0,00	0,31	0,62
	Prótesis de Cadera	Traumatología	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	1,03
	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	0	0	0	0	1	0	0	679	1	0.15	0,65	0,91
Endometritis	Parto Vaginal	Gineco-obstetricia	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	0,00	0,06	0,06
	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	1	0	0	1	1	0	0	679	3	0.44	0,13	0,10
Total			0	1	0	0	2	3	2	0		8			

(*) Hasta la SE 41/2026
Fuente: *Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA*

El Hospital Carlos Alberto Cortez Jiménez Essalud - Tumbes, hasta la SE 41-2026, se ha notificado 08 caso de infección asociada a la atención de salud (IAAS) en el servicio de UCI adulto y servicio de gineco-obstetricia.

La tasa acumulada de IAAS por neumonía asociado a ventilación mecánica en UCI adulto es de 1,90 casos por 1000 días de exposición, que es menor al valor nacional referencial.

La tasa acumulada de IAAS por infección del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central en UCI adulto es de 1,18 casos por 1000 días de exposición, que es igual al valor nacional referencial.

La tasa acumulada de IAAS en ginecobstetricia por infección de sitio quirúrgico asociada a parto por cesárea que es menor al valor nacional referencial (0,15 vs 0,91).

La tasa acumulada de IAAS en ginecobstetricia por endometritis asociada a parto por cesárea que es mayor al valor nacional referencial (0,44 vs 0,10).

Es necesario implementar medidas urgentes que permitan reducir estas incidencias, así como investigar la ocurrencia de brotes, los agentes involucrados y los factores condicionantes.

Te invitamos a revisar la Sala Semanal de Situación de Salud Binacional (Tumbes- El Oro)

Link:

https://binacional.shinyapps.io/binacional_peru_ecuador/

Donde encontrarás información semanal actualizada de la situación de salud de daños priorizados del Cordón Fronterizo 01